

ዴዘት

መግቢያ

የእርግዝና አማራጮችዎ	6
የሚደረገለዎ ምክር	9
በወሲብ የሚተላለፍ ኢንፌክሽን (STI) መከራ	11
መከላከያ	12
የሕክምና አማራጮችዎ	15
አስቀድሞ በህክምና የሚካሄድ የፅንሰ ማስወረድ ተግባር	16
በቀዶ ጥገና ለሚካሄዱ የፅንሰ ማስወረድ ተግባር	28
የቅድመ የቀዶ ጥገና ምክር	36
አስቀድሞ በህክምና፣ እንዲሁም በቀዶ ጥገና ለሚካሄዱ የፅንሰ ማስወረድ ተግባሮች ድሕረ-እንክብካቤ	38
ባልታወቀ ስፍራ የሚገኝ እርግዝና (PUL) እና ከማህጸን ውጪ የሚፈጠር እርግዝና	42
ቬነስ ትሮምቦኤምቦሊዝም (VTE)	45
ከፍተኛ የኢንፌክሽን መወሳሰብ (ሴፕሲስ)ን በተመለከተ መረጃ፣ ለደምበኞች እና ተንከባካቢዎች	48
የአንቲ-ዲ መርፌ	51
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች	53
አስተያየቶች እና ቅሬታዎች	56
ጠቃሚ አድራሻዎች/ቁጥሮች	57
ማስታወሻዎች	58

ራዕይ

በብሄራዊ ያልተፈለገ እርግዝና ምክር አገልግሎት (NUPAS) ሴቶች የፅንሰ ማስወረድ፡ የወሊድ መከላከያ እንዲሁም የጾታዊ ጤንነት አገልግሎት የሚገኙባቸውን አስተማማኝ ቦታዎች ስሜትን ከሚረዱ ባለሙያዎች ጋር በማዋሃድ የግለሰቦችን የመምረጥ መብት እናከብራለን።

እሴቶች

ደምበኞቻችን ለእኛ አስፈላጊዎቻችን ናቸው፡ የመምረጥ መብታቸውን እናከብራለን እንዲሁም በሁሉም መንገድ እንደግፋቸዋለን።



በምናደርገው ነገር ሁሉ ግልጽ እና ታማኝ ነን።
እና በግልጽ

እና በእውነት ከእርስዎ ጋር እንነጋገራለን።



በቡድን እንሰራለን፤ እንዲሁም በተቻለ መጠን የላቀ እንክብካቤ ማድረግ፡ የሚለው የጋራ ግባችን ነው።



ተንከባካቢዎች ነን፤ ለምንሰራው ስራ ጥልቅ ስሜት አለን።



ለሰራተኞቻችን ክብር እና ድጋፍ እንሰጣለን።

ፅንስ ማስወረድ

ፅንስ ለማስወረድ ከወሰኑ ብቻዎትን እንዳልሆኑ ያስታውሱ

በየዓመቱ በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ
ከ 200,000
በላይ የጽንስ ማስወረድ ተግባሮች ይካሄዳሉ

በመላው ዩናይትድ ኪንግደም ከ **3**
ሴቶች ውስጥ **1**
በሕይወታቸው የጽንስ ማስወረድ ተግባር ይፈጽማሉ



ኢንግላንድ እና ስኮትላንድ ውስጥ ፅንስ ማስወረድ ከ **50** ዓመታት በላይ ሕጋዊ ሆኖ ቆይቷል

እርዝ ከሆኑ እና ጽንሱን ማስወረድ ለእርስዎ ትክክለኛው ምርጫ እንደሆነ ከወሰኑ እባክዎ ቀርበው ስለሚገኙ የተለያዩ አማራጮች ለማወቅ ይህንን ቡክሌት ለማንበብ ጊዜ ይውሰዱ።

አገልግሎታችንን እና እንክብካቤያችንን ከ50 ዓመት በላይ ለሆኑ ሴቶች አቅርበናል፤ እንዲሁም ፅንስ ማስወረድን በተመለከተ የሴቶችን መብት ለማስከበር እንታገላለን።

ይህ መፅሐፍ (ቡክሌት) ስለ ፅንስ ማስወረድ ህክምና፣ እንዲሁም ለህክምና ወደ እኛ በሚመጡበት ጊዜ ምን ምን ነገሮች እንደሚካሄዱ የሚያብራሩ ምክሮችን በተመለከተ መረጃ ይሰጣል። ይህ መረጃ በርዕል የማህጸን ህክምና እና እርግዝና ባለሙያዎች ኮሌጅ (RCOG)፣ ብሄራዊ የህክምና ልቀት ተቋም (NICE) እንዲሁም በርዕል የማደንዘዣ ባለሙያዎች ኮሌጅ (RCOA) በተሰጡ መመሪያዎች መሰረት የተዘጋጀ ነው።

የድሕረ እንክብካቤ እገዛ መስመር

ስልክ: 0333 016 0400

ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)

የፅንሰ ማስወረድ ሕግ

በ1967ቱ የፅንሰ ማስወረድ ሕግ መሰረት፡ ዩኬ ውስጥ እስከ 23 ሳምንት ከ 6 ቀን የእርግዝና ግዜ ውስጥ ያለ ፅንሰን ማስወረድ በሕግ ይፈቀዳል። በልዩ ሁኔታዎች ምክንያት ብቻ ከ24 ሳምንት ዕድሜ ያለውን ፅንሰ እንዲወርድ ይደረጋል ለምሳሌ የእናት ህይወት ለአደጋ ሲጋለጥ ወይም ፅንሰ ላይ ያልተለመዱ ነገሮች ሲያጋጥሙ።

ሕጉ፡ በእርግዝና ከመቀጠል ፈንታ ፅንሱን ማስወረድ በአእምሮ እና አካላዊ ጤናዎ ላይ ያነሰ ጉዳት ሊመጣ ይችላል በማለት ሁለት ዶክተሮች ሊስማሙ እንደሚገባ ይገልጻል። ከዚያ በኋላ ሁለቱ ዶክተሮች ኤች ኤስ ኤ 1 (HSA1) የተባለውን ሕጋዊ ቅፅ ሞልተው መፈረም ይገባቸዋል።

የፅንሱን ጾታ ምክንያት በማድረግ የፅንሰ ማስወረድ ህክምና ማካሄድ በሕግ አይፈቀድም።

ፅንሰ ማስወረድ በሆስፒታል ወይም ፈቃድ በተሰጠው ልዩ ህክምና ክሊኒክ ብቻ ነው የሚካሄደው።

ፅንሰ ማስወረድ ምንድነው?

ፅንሰ ማስወረድ ፅንሰን የማቆም ሂደት ነው፡ በተጨማሪም "ማቋረጥ" ተብሎ ይጠራል።

ፅንሰ የማቋረጥ ግዜ ግራ የሚያጋባ፡ አስጨናቂ እና የሚረብሽ ግዜ ሊሆን ይችላል። እኛ ይህ ይገባናል ስለሆነም ይህን አስቸጋሪ ጊዜ እንዲያልፉ እንክብካቤ እና ድጋፍ እንደምናቀርብ ቃል እንገባለን።

ምስጢራዊነት

ከእኛ ጋር የሚኖርዎ ግንኙነት፡ ወይም የሚያገኙት ህክምና በሙሉ በሚስጥር የተጠበቀ ነው። ከ16 ዓመት በታች ቢሆኑም እንኳን፡ የእርስዎን ፈቃድ ካላገኘን ለማንም ሰው አንናገርም። እርስዎ እጅግ በጣም ከባድ ለሆነ አደጋ የተጋለጡ ከሆነ ብቻ ነው፡ የግል መረጃዎትን ለሌሎች የጤና በለሙያዎች፡ ወይ ድርጅቶች

ስልክ: 0333 004 6666 ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)

የምናጋራው። ሁልጊዜም ይህንን ማድረግ እንዳለብን ስናስብ፣ አስቀድመን ለእርስዎ እናሳውቃለን።

ወጣቶችን እና ተጋላጭ ትልቅ ሰወች ከሆንክ

ሁሉም ባለሙያዎች፣ የወጣቶችን እና ተጋላጭ አዋቂዎችን ደህንነት ለመጠበቅ ቁርጠኝነት ያሳያሉ። መገለል አካላዊ፣ ጾታዊ ወይም ስሜታዊ ጉዳት ወይ ብዝበዛ እንዳይፈጸምባቸው፣ ምክንያታዊ የሆነውን እርምጃ በሙሉ ይወስዳሉ። "የአደጋ ስጋት" ላይ መሆንዎ ከታወቀ፣ የብሄራዊ ያልተፈለገ እርግዝና ምክር አገልግሎት (NUPAS) ሰራተኞች እርስዎን ለመጠበቅ፣ የሚያስችላቸውን አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ከእርስዎ ጋር ይተባበራሉ።

የእርግዝና አማራጮች

ያሎት አማራጮች የሚከተሉት ናቸው፡

- በእርግዝናው መቀጠል፡
- በእርግዝናው መቀጠል እና ለጉዲፊቻ ወይም ለማደጎ መስጠት
- ፅንሰን ማስወረድ

በእርግዝናው መቀጠል፡

እርግዝናውን ለመቀጠል ከመረጡ፣ ጂ ፒዎን ማነጋገር አለብዎት ወይም አዋላጅዎትን በቀጥታ ማነጋገር ይችላሉ (የአካባቢዎን ሆስፒታል ድረ-ገጽ ይመልከቱ)፡ እነርሱ እርግዝናዎን ያረጋግጣሉ እንዲሁም ከአካባቢዎ አዋላጅ ጋር ቀጠሮ ያዘጋጁልዎታል። በእርግዝናዎ ግዜ አዋላጅ ነርስ (ሚድዋይዊ) የቅድመ ወሊድ እንክብካቤ ያደርጉልዎታል። እርግዝናው ለመቀጠል ከወሰኑ የቅድመወሊድ እንክብካቤ ለማግኘት ወዲያውኑ ጂ.ፒ.ዎን/አዋላጅ ነርስ (ሚድዋይዊ) ማሳወቅ ይገባዎታል። ስለ ቅድመ ወሊድ እንክብካቤ እና የአካባቢ አገልግሎቶች የበለጠ ለማወቅ www.nhs.uk ይጎብኙ።

ጉዲፊቻ ወይም ማደጎ እንክብካቤ

ፅንሰ ማስወረድ ካልፈለጉ ለጉዲፊቻ መስጠት ምርጫዎ ሊሆን ይችላል። በእርግዝናዎ ይቀጥላሉ ልጁንም ይወልዳሉ፣ ይሁን እንጂ ህጻኑን አደንከባከቡም ወይም በጉዲፊቻ ከሰጡ በኋላ፣ ልጁን በተመለከተ ህጋዊ መብት ወይ ሃላፊነት አይኖርዎትም።

ጉዲፊቻ በጉዲፊቻ [ድርጅቶች] እና የአካባቢ መስተዳድሮች የሚመቻች እና፣ በፍርድ ቤት ህጋዊነትን የሚላበስ መደበኛ ሂደት ነው። አንዴ

ጉዲፊቻ ህጋዊ ከሆነ በኋላ ውሳኔው የመጨረሻ ነው እና ሊለወጥ አይችልም።

ድጋፍ ከየት ማግኘት እችላለሁ?

- የእርስዎ ጄ.ፒ.
- በወሊድ አገልግሎት ላይ ያተኮረ የአካባቢዎ ሆስፒታል ማህበራዊ ሰራተኛ፣ ወይም ስለ ጉዲፊቻ ለመወያየት የአካባቢዎን የማህበራዊ አገልግሎት ቡድን ያነጋግሩ
- ከጉዲፊቻ እና ማደጎ ጋር በተያያዘ፣ በመላው ዩኬ ከሚንቀሳቀሱ አካላት ጋር የሚሰራውን ብሪትሽ የጉዲፊቻ እና ማደጎ ማህበር (BAAF) ያግኙ።
020 7520 0300 ወይም www.corambaaf.org.uk
ልታገኛቸው ይችላሉ።

የእርስዎ ውሳኔ

ሰዎች ፅንሰን ማስቆም የሚወስኑባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ይሁን እንጂ ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን ውሳኔው የደምበኛው ነው መሆን ያለበት።

ፅንሰ ለማስወረድ የሚወስኑት ውሳኔ የእርስዎ ግላዊ ውሳኔ ነው። እና ጫና ውስጥ፣ ወይም በማንም ሰው እየተገደዱ ያሉ ሆኖ ሳይሰማዎ ሊወስኑ ይገባል። ለአንዳንድ ሰዎች፣ ያለ ዕቅድ የተረገዘን እርግዝና ምን ላድርገው ብሎ መወሰን አስቸጋሪ፣ ወይም አስጨናቂ ጊዜ ሊሆን ይችላል።

ሁሉም ሴቶች ይህንን ሁኔታ በተለያየ መንገድ ሊቋቋሙት ይችላሉ። አንዳንድ ሴቶች እርግዝናውን ለማቆም በወሰኑት ውሳኔ የሚተማመኑ ሲሆን፣ አንዳንዶቹ ፅንሰ ካስወረዱ በኋላ ከሚሰማቸው ስሜት ጋር ለመታረቅ ትግል ያደርጋሉ።

የምክር አገልግሎት

ከፅንሰ ማስወረድ በፊት እና በኋላ የምክር አገልግሎት እንሰጣለን። የምክር አገልግሎት ቀጠሮዎች በስልክ ይካሄዳሉ። እባክዎ የ[አእምሮ] ቀውስ አገልግሎት እንዳልሆነ ይገንዘቡ፡ የአእምሮ ጤናዎን በተመለከተ፣ አስቸኳይ ድጋፍ ክሳራለግዎ ወደ ልዩ ባለሙያ ሊመሩ ይገባል።

ስለ ውሳኔው እና ስለ ስሜትዎ ከሰው ጋር መነጋገር ያስፈልገኛል ብለው ካሰቡ እባክዎ በ0333 004 6666 ይደውሉ።- በማንኛውም ጊዜ የቀረቡልዎት አማራጮች በተመለከተ፣ የቡድኖችን አባል ጋር መነጋገር ይችላሉ። እንዲሁም የምክር አገልግሎት እንዲያገኙ ልናመቻችልዎ እንችላለን።



የድህረ እንክብካቤ እገዛ መስመር

ስልክ: 0333 016 0400

ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)



ስልክ: 0333 004 6666 ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)

የሚደረገልዎ ምክር

ማንኛውም ህክምና እንዲሰጥ ከመወሰኑ በፊት፣ ከህክምና ባለሙያ ጋር የምክክር ጊዜ ይኖርዎታል። ባለሙያው ስለሁሉም የህክምና አማራጮች ገለጻ ያደርግልዎታል። ስለ ፅንሰ ማስወረድ ሊኖርዎ የሚችለውን ማንኛውም ጥያቄ ይመልስልዎታል።

የህክምና ግምገማ

የህክምና ባለሙያው ስለ ሕክምና፣ የእርግዝና እንዲሁም የማህጸን ህክምና ታሪክ ይጠይቅዎታል። የሚጠየቁትን ጥያቄዎች በቀናነት መመልስ እንዲሁም ስለነበርዎ የጤና ሁኔታ፣ እየወሰዱ ስላሉት መድሃኒቶች በተቻለ መጠን ብዙ መረጃ መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው። ይህ ደህንነትዎን እና የሚሰጥዎትን ህክምና ሁነኛነት ለማረጋገጥ ያግዛል። እባክዎ ጡት የሚያጠቡ ከሆነ፣ ለህክምና ባለሙያው ያሳውቁ። ከህክምና ባለሙያው ጋር የሚያደርጉት የምክክር አገልግሎት በስልክ፣ ወይም ከፈለጉ ፊት ለፊት ይካሄዳል። እባክዎ [በስልክ ለሚደረግ ምክክር] በደንብ ሊሰሙ በሚያስችልዎ እና ብቻዎትን በሚሆኑበት ጾጥ ያለ አካባቢ መኖርዎን ያረጋግጡ።

በምክር አገልግሎቱ ግዜ የህክምና ባለሙያው የባላዘር በሽታዎች ምርመራ ውጤቶችን በተመለከተ እና፣ ስለ እርግዝና መከላከያ አማራጮች ማብራሪያ ይሰጣል። በአቅርቦት ላይ ስላሉ የወሊድ መከላከያ ዓይነቶች ምክር እንሰጣለን። ከፅንሰ ማስወረድ በኋላ አሁንም ሊያረግዙ ስለሚችሉ፣ ለወሊድ መከላከያነት የሚጠቀሙበትን ዓይነት ምን እንደሆነ ማወቅ፣ በጣም አስፈላጊ ነው (ስለ ወሊድ መከላከያ አማራጮች ገፅ 12ን ይመልከቱ)።

የህክምና ባለሙያው ስለ ፅንሰ ማስወረድ ሂደት መረዳትዎን ይጠይቅዎታል። እንዲሁም ህክምና ለመቀበል ፈቃድ ስለመስጠት ግንዛቤው ያለዎት መሆኑን ያረጋግጣል።

የአልትራሳውንድ ስካን

እንደ እርስዎ የሕክምና፣ የፅንሰና የማህፀን ሕክምና ታሪክ ላይ በመመስረት፣ ፅንሰ ለማስወረድ የአልትራሳውንድ ስካን ማድረግ ሊያስፈልግዎ ወይም ሊያስፈልግ ይችላል። ካስፈለገ፣ የእርግዝናውን ዕድሜ ለማወቅ፣ እንዲሁም የተዘጋጀልዎን የህክምና አማራጮች እንዲወስኑ ለማግኘት የአልትራሳውንድ ስካን ሊያደርጉ ይችላሉ። አንዳ አንድ ግዜ እርግዝናውን ሆድ ላይ በሚደረግ ስካን ለማየት፣ በጣም ገና ሊሆን ይችላል፣ እና ትንሽ የአልትራሰውንድ መሳሪያ በብልት በኩል ማስገባት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። በብልት በኩል በሚደረግ ስካን እርግዝናውን ማየት ካልቻልን፣ እርግዝናው እንደሚጠበቀው እያደገ ስለመሆኑ እርግጠኞች ልንሆን አንችልም፣ ስለዚህ የህክምና ባለሙያው ይህን በተመለከተ ከእርስዎ ጋር ይነጋገራል። እንዲሁም ድጋሚ ስካን የሚደረግበትን ግዜ ያመቻቻል።

ይህ የሆነበት ምክንያት ምናልባት እርግዝናው በስካን የሚታይበት ግዜ፣ በጣም ገና ስለሆነ ወይም አስቀድሞ የፅንሰ መጨነገፍ ሁኔታ ስላጋጠመ ይችላል፣ ወይም እርግዝናው ከማህፀን ውጪ ባለ የአካል ክፍል ውስጥ ስላደገ ሊሆን ይችላል- ከማህፀን ውጪ ስለሚያድግ እርግዝና ተጨማሪ መረጃ እና ምክር ለማግኘት ገፅ 42ን ይመልከቱ

የድሕረ እንክብካቤ እገዛ መስመር

ስልክ: 0333 016 0400

ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)



ስልክ: 0333 004 6666 ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)

STIs - በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች

ከሚሰጥዎ የምክር አገልግሎት ጋር ተያይዞ STIs - በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች ምርመራ እንዲደረግልዎ ይጋበዛሉ። የአባላዊ በሽታ ያለመከላከያ በሚደረግ የብልት፣ የአፍ፣ የመቀመጫ ወሲብ፣ ወሲብ መፈጸሚያ መሳርያዎችን በመጋራት እንዲሁም ብልት ከብልት በማነካካት የሚተላለፍ በሽታ ነው። በጣም የተለመደው የአባላዊ በሽታ ምልክት **ምንም ምልክት አለመኖር ነው። ማለት ብዙ ሰዎች የአባላዊ በሽታ እንዳለባቸው አያውቁም።** የአባላዊ በሽታ ካልታከመ ወደ ተራዘመ ችግር ይመራል። ለምሳሌ ዳሌ አካባቢ የሚያቃጥል (የሚቆስል) በሽታ ወይም መኸንነት (ልጅ ያለመውለድ ችግር)።

የአባላዊ በሽታ ምርመራ በብሄራዊ ያልተፈለገ እርግዝና ምክር አገልግሎት (NUPAS)

የብሄራዊ ያልተፈለገ እርግዝና ምክር አገልግሎት (NUPAS) የክላሜዲያ፣ ጨብጥ፣ ኤች አይ ቪ እና ቂጥኝ ምርመራዎችን ያደርጋል። ምርመራዎቹ ፈጣን እና ምቹ ናቸው። ይህም ማለት፡ ከሰውነት ክፍል ተጠርጎ የሚወሰድ ናሙና (ስዋብ)፤ ወይም ሽንት እንዲሁም ከጣት ላይ ደም መውሰድ ብቻ ነው የሚያስፈልገን።

የአባላዊ በሽታ እንደሌለዎ የሚያውቁበት ብቸኛው መንገድ መመርመር ነው። ይህ በተለይ ያለመከላከያ ወሲብ ከፈጸሙ፣ በቅርቡ ጓደኛ ከቀየሩ፣ ወይም ጓደኛዎ ከሌላ ሰው ጋር ወሲብ ፈፅመው ከነበረ፣ ምርመራ ቢያደርጉ ይመከራል። የአባላዊ በሽታዎች አንድ ጊዜ በህክምና መኖራቸው ከተረጋገጠ፣ አንቲ ባዮቲክስ በመስጠት በቀላሉ ሊታከሙ ይችላሉ። ከዚህ በፊት STIs - በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች ምርመራ ካላደረጉ፤ አሁን የማድረጋቸው ጥሩ ጊዜ ነው። ምርመራ ማድረግ፣ እና የጾታዊ ጤንነትን እየጠበቁ መኖርን በተመለከተ ከጓደኛዎ ጋር ሊነጋገሩበት ይገባል። በተጨማሪም ምርመራውን በአካባቢዎ በሚገኘው የጾታዊ ጤንነት አገልግሎት፣ የወሊድ መከላከያ እና የጾታዊ ጤንነት ክሊኒክ፣ እንደ `ብሩክ` Brook ባሉ የተለየ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ወይም ወደ ጂ.ፒ.ዎ በመሄድ ሊያደርጉ ይችላሉ። የ **(NHS Choices)** **ኤን ኤች ኤስ ቺይስስ** በሚለው ድረ-ገፅ ላይ በአካባቢዎ የሚገኙትን አገልግሎቶች ያገኛሉ፡ **www.nhs.uk**

የወሊድ መከላከያ

ከሚሰጥ የምክር አገልግሎት ጋር ተያይዞ፣ የህክምና ባለሙያው ስለተዘጋጀልዎ የእርግዝና መከላከያ መንገዶች ገለጻ ያደርግልዎታል። ሴት ልጅ ፅንሰ ካስወረደች በኋላ፣ በ5 ቀናት ውስጥ ለእርግዝና ዝግጁ ልትሆን፣ እንዲሁም የእርግዝና መከላከያ ካልተጠቀመች ደግሞ ልታረግዝ ትችላላችሁ። በጣም ብዙ የእርግዝና መከላከያ አማራጭ መንገዶች አሉ፣ ስለዚህ የመጀመርያው ዓይነት የሚሰማማዎ ካልሆነ ፍላጎትዎን አይዝጉ። ሌላ መንገድ ሊሞክሩ ይችላሉ። ብዙ የእርግዝና መከላከያ መንገዶች በሚገባ ከተጠቀሙባቸው፣ ከ99% በላይ ውጤታማ ናቸው።

ለረጅም ጊዜ የሚያገለግል እና ሊለወጥ የሚችል የእርግዝና መከላከያ- LARC

LARC በጣም አስተማማኝ ነው፣ ምክንያቱም ለመጠቀም ሁልጊዜ ማስታወስ አያስፈልግም-

ሰውነት ውስጥ የሚቀበር የእርግዝና መከላከያ (ኢንፕላንት)- ይህ የእርግዝና መከላከያ በጣም ውጤታማው መንገድ ነው። ከ99% በላይ ውጤታማ ነው። ከ1000 ሰዎች መሃል ከ1 ያነሱ ሴቶች መጠቀም በጀመሩ፣ የመጀመሪያ ዓመት ውስጥ ያረግዛሉ። አንድ ጊዜ ሰውነት ላይ ከተቀበረ ለ3 ዓመታት እርግዝናን የመከላከል ስራ ይሰራል። ባስፈልገዎ ጊዜ በቶሎ ሊያስወጡት ይችላሉ፣ እንዲሁም አንዴ ከወጣ በኋላ በቶሎ ለእርግዝና ዝግጁ መሆን ይጀምራሉ።

እንዴት ነው የሚሰራው ለሚለው ትንሽ ተጣጣፊ ቱቦ መሳይ በክንድዎ ቆዳ ስር ይቀመጣል። ፕሮጀስቲቮን የተባለውን ሆርሞን ያመነጫል። የእንቁላል ማምረት ስራን (ኦቭዩሌሽን) ያስቆማል፣ የወንዴ ዘር ወደ እንቁላል እንዳይደርስ የዳሌ ፈሳሽን ያቀጥናል፣ እንዲሁም የማህጸን ግድግዳ መስመሮችን እንዲቀጥኑ በማድረግ፣ የወንዴ ዘር የገባበትን እንቁላል እዛው እንዳይቀር ያደርጋል።

ኢንትራዩትሪን ዲቫይስ (IUD) - ባለመዳቡ ኢንትራዩትሪን ዲቫይስ (IUD) ከ99% በላይ ውጤታማ ነው። ከ100 ሰዎች መሃል ከ1 ያነሱ የኢንትራዩትሪን ዲቫይስ (IUD) ተጠቃሚ ሴቶች፣ በመጀመሪያ ዓመት ውስጥ ያረግዛሉ። አንድ ጊዜ ሰውነት ውስጥ ከተቀበረ፣ እንደ አይነቱ

ከ5-10 ዓመታት እርግዝናን ይከላከላል። እንዲሁም ምርጫዊ ሲሆን ወዲያውኑ ሊያስወጡት ይችላሉ። IUD ከተነቀለልዎ በኋላ፣ ወዲያውኑ እንደተለመደው ለማርገዝ ዝግጁ ይሆናሉ።

እንዴት ነው የሚሰራው ለሚለው፡ ትንሽ ተታጣፊ የፕላስቲክ እና መዳብ መሳሪያ፣ በማህጸን ውስጥ ይቀመጣል። መዳቡ የወንዴ ዘርን እና እንቁላልን በህይወት እንዳይቆዩ ይከላከላል። በተጨማሪም የማህጸንዎን ፈሳሽ፣ የወንዴ ዘር ወደ እንቁላል መድረስን እንዲያስቆም ያደርጋል። IUD በተጨማሪ የወንዴ ዘር የገባበት እንቁላል፣ በማህጸን ውስጥ እንዳይቆይ ያደርጋል።

አንትራቶትሪን ሲስተም (IUS)- ይህ ከ99% በላይ ውጤታማ ነው። ከ100 ሰዎች መሃል ከ1 ያነሱ የአንትራቶትሪን ሲስተም (IUS) ተጠቃሚ ሴቶች፣ በመጀመሪያ ዓመት ውስጥ ያረግዛሉ። አንድ ግዜ ሰውነት ውስጥ ከተቀበረ፣ እንደ ዓይነቱ ከ3-5 ዓመታት እርግዝናን ይከላከላል። እንዲሁም ምርጫዊ ሲሆን ወዲያውኑ ሊያስወጡት ይችላሉ። መሳሪያው አንዴ ከወጣ በኋላ፣ ወዲያውኑ ለእርግዝና ዝግጁ መሆኑ ይጀምራሉ።

እንዴት ነው የሚሰራው ለሚለው፡ ትንሽ ተታጣፊ የ T ቅርፅ ያለው የፕላስቲክ መሳሪያ በማህጸን ውስጥ ይቀመጣል። ፕሮጀስቲቮን የተባለውን ሆርሞን



ይለቀቃል። የማህጸን ግድግዳ መስመሮችን እንዲቀጥኑ በማድረግ፣ የወንዴ ዘር የገባበትን እንቁላል እዛው እንዳይቀር ያደርጋል። እንዲሁም የወንዴ ዘር ወደ እንቁላል እንዳይደርስ የዳሌ ፈሳሽን ያቀጥናል።

የእርግዝና መከላከያ መርፌ- የእርግዝና መከላከያ መርፌን ትእዛዙን በትክክል ከተከተሉ(በየ 13 ሳምንት ከተወገ) እርግዝናን በመከላከል ረገድ ከ99% በላይ ውጤታማ ይሆናል። መርፌውን ከሚወጉ 100 ሰዎች መሃል ከ1 ያነሱት ያረግዛሉ።

እንዴት ነው የሚሰራው ለሚለው፡ ዴፖ ፕሮቬራ የተባለው መከላከያ በጡንቻዎ ላይ በተለመደ መቀምጫዎ ወይም አንዳንድ ግዜ ክንድዎ ላይ ይወጋሉ።ሳያና ፕሬስ በትንሽ መርፌ ከጭንዎ ወይም ከሆድዎ ፊት ለፊት ከቆዳው በታች ተወግዷል።

ሳያና ፕረስን እራስዎ በቤትህን ውስጥ ሊወጉት ይችላሉ። መርፌው ፕሮጀስትሮን የተባለውን ሆርሞን በመርጨት፣ የእንቁላል ማምረት ስራን (ኦቭዩሌሽን) ያስቆማል፡ የወንዴ ዘር ወደ እንቁላል እንዳይደርስ፣ የዳሌ ፈሳሽን ያቀጥናል እንዲሁም የማህጸን ግድግዳ መስመሮችን እንዲቀጥኑ በማድረግ፣ የወንዴ ዘር የገባበትን እንቁላል እዛው እንዳይቀር ያደርጋል።

ሌሎች በጣም ውጤታማ የሆኑ የእርግዝና መከላከያ ዓይነቶችም አሉ- ሰውነት ውስጥ ከሚቀበሩት የእርግዝና መከላከያዎች ቀጥሎ፡ የእርግዝና መከላከያ ሽቦ፡ በመርፌ የሚሰጡ ፡ በአፍ የሚወሰዱ ኪኒኖች እና ኮንዶሞች።

እነዚህ አማራጮች በሙሉ በብሄራዊ ያልተፈለገ እርግዝና ምክር አገልግሎት (NUPAS) ይገኛሉ፤ እንዲሁም ከምንሰጠው አገልግሎት ጋር ተያይዞ ስለ አማራጮች እንነግርዎታለን፡ እርግዝና መከላከያውን እንሰጥዎታለን እንዲሁም እርግዝና መከላከያውን ለረጅም ግዜ እንዲጠቀሙበት የሚያስችልዎትን እቅድ ማውጣት ላይ እናግዝዎታለን።

ስለ ወሊድ መከላከያ ተጨማሪ መረጃ - ድረገጻችን ላይ www.nupas.co.uk፣ ወይም ሐኪምዎን፣ ነርስዎን ወይም የአካባቢዎን የወሲብ ጤና ክሊኒክ ወይም እንደ ብሩክ ያለውን የልዩ ሙያ ክሊኒክ ይጎብኙ www.fpa.org.uk/resources ይጎብኙ ወይም www.sexwise.org.uk/Contraction/

የህክምና አማራጮች

የትኛው ፅንሰ ማስወረድ ለእርስዎ ተስማሚ እንደሆነ ሲያስቡ ብዙ አማራጮች አሉዎት። ለእርስዎ ያለው የፅንሰ ማስወረድ ዓይነት የሚወሰነው፣ እርስዎ ምን ያህል ሳምንታት እርጉዝ እንደሆኑ (ይህ ጀስተሽን ተብሎ የሚጠራው በማህፀን ውስጥ ያለው የእድገት ጊዜ)፣ እና ማንኛውም ባለዎት የጤና ሁኔታ ላይ በመመስረት ለህክምናው አይነት ተስማሚነትዎ ይፈቀድልኛል። በምክክሩ ግዜ ይህንን አስመልክቶ ሙሉ ማብራሪያ የስጥባቸዋል፣ እንዲሁም የተመረጠው ህክምና እንደሚስማማዎ ለማረጋገጥ በህክምና ቡድን ግምገማ ይደረግባቸዋል።

የፅንሰ ማስወረድ ዓይነቶች

አስቀድሞ በህክምና የሚካሄድ የፅንሰ ማስወረድ ተግባር (EMA)

(ከ 10 ሳምንታት በታች እርጉዝ ከሆነች

- ወደ መኖሪያ ቤት አድራሻዎ በፖስታ የሚላክ ህክምና
- ወደ ክሊኒክ በአካል በመምጣት የሚወሰድ ህክምና።
- በክሊኒክ የሚሰጥ ህክምና - ኢንተርቫል

የቀዶ ጥገና አማራጮች

- በመደበኛ ማደንዘዣ የሚካሄድ ቀዶ ጥገና
- እንቅልፍ በሚያስተኛ ማደንዘዣ የሚካሄድ ቀዶ ጥገና
- በአጠቃላይ ማደንዘዣ የሚካሄድ ቀዶ ጥገና

ኢንግላንድ፡ ዌልስ እና ኖርዘርን አየርላንድ የሚኖሩ ከሆነ አብዛኛው ፅንሰ ማስወረድ ወጪ በኤን ኤች ኤስ ይሸፈናል።

አስቀድሞ በህክምና መንገድ የሚካሄድ ማስወረድ አስቀድሞ በህክምና መንገድ የሚካሄድ ማስወረድ (EMA) ወይም 'የፅንሰ ማስወረጃ ኪኒን' - ፅንሱን ለማስቆም ሁለት ኪኒኖችን መውሰድ ይመለከታል።

የመጀመሪያው መድሃኒት፡ ሚፍፕሪስቶን ፕሮጀትሮን የተባለውን ሆርሞን በመገደብ ይሰራል። ፕሮጀስትሮን በሌለበት፡ የማህጸን ግድግዳ መስመሮች ይሰባባሩ እና ፅንሱ መቀጠል ያቅተዋል።

ሁለተኛው መድሃኒት፡ ሚሶፕሮስቶል፡ ማህጸን እንዲጨባበጥ ያደርጋል፡ የመቁረጥ ስሜት ያመጣል፡ ደም ማንጠብጠብ እና ልክ እንደ ፅንሰ መጨንገፍ የመሰለ የእርግዝና መቁረጥን ያስከትላል።

(ያስታውሱ፡ ሚሶፕሮስቶል ዩኬ ውስጥ በእርግዝና ወቅት እንዲወሰድ አይፈቀድም። ይሁን እንጂ እርግዝናን ለማቆም በምርጫ የሚወሰድ መድሃኒት ተደርጎ ይቆጠራል።)

አስቀድሞ በህክምና የሚካሄድ ፅንሰ ማስወረድ ጥቅሞች የሚከተሉት ናቸው፡

- ሰውነት ውስጥ መትከል፣ ወይ መቅበር እንዲሁም ማደንዘዣ አያስፈልግም
- ከፍተኛ የአስተማማኝነት ደረጃ
- ህክምናው ወደ ክሊኒክ መጓዝ ሳያስፈልግ በጣም በቅርቡ ሊያገኙት የሚችሉ ህክምና ነው
- ከህክምናው በፊት ሊመገቡ እና ሊጠጡ ይችላሉ።
- እርግዝናው ተቋርጦ በሚወጣበት ጊዜ አቤትዎ ሊቆዩ ይችላሉ።

ወደ መኖሪያ ቤት አድራሻዎ በፖስታ የሚለክ ህክምና (የፖስታ ኪኒኖች)

የፖስታ ኪኒኖች በመጀመሪያዎቹ የእርግዝና ግዜያት (ከ6 ሳምንት እና 6 ቀናት አስቀድሞ)፣ እርግዝናን ለማስቆም አስተማማኝ እና ህጋዊ መንገዶች ናቸው። የፖስታ ኪኒኖች የሚስማማዎት ከሆነ ከምክክር ግዜያችን በኋላ ኪኒኖች፡ እንዲሁም ኪኒኖችን እንዴት መውሰድ እንዳለብዎ የሚገልፅ ሙሉ መመሪያ፣ እንዲሁም ከማስወረድ በኋላ ስለሚደረግልዎ እንክብካቤ መረጃ በፖስታ ይላክልዎታል።

የመጀመሪያውን ኪኒን አወሳሰድ - በመጀመሪያው ኪኒን እና በሁለተኛው ኪኒን መካከል 24-48 ሰዓታት ክፍተት መፍጠር አስፈላጊ ነው።

የመጀመሪያውን ኪኒን (ሚፍፕሪስቶን) ከውሃ ጋር ይውሰዱት።

የመጀመሪያውን ኪኒን ከወሰዱ በኋላ በ90 ደቂቃዎች ውስጥ ወዲያውኑ 0333 016 0400 በመደወል ሊያስታውቁን ይገባል። ምክንያቱም ሌላ ኪኒን መውሰድ ሊያስፈልግዎ ይችላል።

ሁለተኛውን ኪኒን ስለ መውሰድ - የአስቀድሞ በህክምና መንገድ የሚካሄድ ፅንሰ ማስወረድ EMA (ኢንተርቫል)ን በተመለከተ ገፅ 18 ላይ ያለውን ሙሉ መመሪያ ያንብቡ

በተጨማሪም እሽጉ የሚከተሉትን ያካትታል፡-

- የወሊድ መከላከያ በራሪ ወረቀት
- ኮንዶሞች
- የእርግዝና መመርመሪያ አቃዎች።

ወደ ክሊኒክ በአካል በመምጣት የሚወሰድ ህክምና

ያለቀጠሮ የሚመጣበት ክሊኒክ አይደለም። በቴሌፎን በሚደረግልዎ የምክር አገልግሎት ላይ ቀጠሮ እንዲያዝልዎ መጠየቅ ያስፈልግዎታል።

አስፈላጊ መረጃ

የመጀመሪያውን ኪኒን ከወሰዱ በኋላ ሃሳብዎን ከቀየሩ፣ እና በእርግዝናው ለመቀጠል ከወሰኑ፣ ጤናማ እርግዝና ይኖርዎታል ብለን ዋስትና ልንሰጥዎ አንችልም። እናም በተቻለ መጠን ጂ.ፒ.ዎን በማግኘት፣ የቅድመ ወሊድ እንክብካቤ እንዲያመቻቹ እንመክራለን።

የሕግ መረጃ

እነዚህ መድሃኒቶች ለእርስዎ [ብቻ] የታዘዙ ናቸው።

መድሃኒትዎን ለሌላ ሰው እንዲሰጡ ህጉ አይፈቅድም። ምክንያቱም ለእርስዎ በግል የታዘዘልዎ ስለሆነ። መድሃኒቱን ካልተጠቀሙበት፣ እንዴት ሊያስወግዱት እንደሚገባ ለመነጋገር ይደውሉልን።

ይህ የህክምና ድጋፍ ለማግኘት ከመጠየቅ ወደኋላ ሊጎትትዎ አይገባም።

በመድሃኒት ጽንሰ ማስወረድ ካልፈቀዱ እና መድሃኒቱን ካልተጠቀሙበት እባክዎ፡

- መድሃኒቱን ወደ በብሄራዊ ያልተፈለገ እርግዝና ምክር አገልግሎት (NUPAS) ወይም ፋርማሲ ይመልሱ።
- መድሃኒቱን ለሌላ ሰው መስጠት ሕገ-ወጥ ተግባር ነው።
- መድሃኒቱን ከ19 ሳምንታት በላይ በቤት ውስጥ መጥቀም ወይም ለሌላ እርግዝና መጠቀም ሕገ-ወጥ ተግባር ነው።

አስቀድሞ በህክምና መንገድ የሚካሄድ ፅንሰ ማስወረድ

(ኢንተርቫል)- በቤት ውስጥ የሚሰጥ ሁለተኛው የህክምና ደረጃ

በስልክ ምክክሩ ግዜ በኋላ ወደ ክሊኒክ በሚመቻቸው ግዜ እንዲመጡ ቀጠሮ ይያዝልዎታል። የእርግዝናውን እድሜ ለማወቅ የአልትራ ሳውንድ ስካን እንዲደረግልዎ ይጠየቃሉ። ከዚያ በኋላ የሚሰማማዎት ከሆነ የሚፍጥረሱቶን ኪኒን በአፍ እንዲወስዱ (ከውሃ ጋር እንዲወጡ) ይሰጥዎታል።

የሚፍጥረሱቶን መድሃኒቱን እንደዋጡ ወዲያውኑ ክሊኒኩም ለቀው ይሄዳሉ። በመኖሪያ ቤትዎ ለሚደረግልዎ የሁለተኛ ደረጃ ህክምና 6 የሚሰጥፍሰቶል ኪኒኖች እና፣ የህመም ማስታገሻዎች ይሰጥዎታል።

የሚሰጥፍሰቶል ኪኒኖች ሚፍጥረሱቶን ከወሰዱ በኋላ (የመጀመሪያው የህክምና ደረጃ) በ24-48 ሰዓታት ውስጥ ሊወሰዱ ይገባል።

ሚሰጥፍሰቶልን እንዴት እንደሚወስዱ በተመለከተ

የሚሰጥፍሰቶል ኪኒኖች ብልት ውስጥ ወይም በጉንጭ እና በድድ መካከል ይቀመጣሉ። ተጨማሪ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ምስሉን ይመልከቱ፡ ሚሰጥፍሰቶል ጠንካራ፡ የሚያሳምም ቁርጠት እና ከባድ የደም መፍሰስ ያስከትላል።

ማንኛውንም ህክምና ከመጀመርዎ በፊት፣ እንዲሁም የሚሰጥፍሰቶል ኪኒን በአፍዎ ወይ ብልትዎ ላይ ከማስቀመጥዎ ወይ ካስቀመጡ በኋላ እጆችዎን በሳሙና እና ውሃ በደንብ መታጠብ ይኖርብዎታል።

በብልት ውስጥ ማስቀመጥ

- 1 የሽንት ፊኛን ባዶ ያስቀሩ
- 2 ውሃ እና ሳሙና በመጠቀም እጅዎን በደንብ ይታጠቡ

3 በተቻለ መጠን

ወደ ላይ አራት

ኪኒኖችን ብልት

ውስጥ ያስገቡ።

ኪኒኖቹ ወደ ውጪ

እስካለ ድረስ፣ በውስጥ

የሚቀመጡበት

ትክክለኛው ቦታ አስፈላጊ

አይደለም። በተቻለ

መጠን በጣት

ጫፍ በጣም አርቀው


ይግፋት፡ ከፈለጉ

አንድ በአንድ ወይም ሁሉንም በአንድ ላይ ያስቀምጡ። ኪኒኖቹን

በመጋደም፡ ቁጢጥ በማለት ወይም አንድ እግርዎን ከፍ አድርገው

በመቆም ሊከቱት ይችላሉ- የሚያመችዎትን መንገድ መርጠው

መጠቀም ይችላሉ።




4 ከ 3 ሰዓታት በኋላ፣ ጥሩ ስሜት እየተሰማዎት ግን ደም እየፈሰሰብዎ ከሆነ ወይም ትንሽ ነጠብጣብ/መፍሰስ ብቻ ካለዎት ተጨማሪ ሁለት (2) ኪኒኖችን ወደ ብልት ወይም በሁለቱም ጉንጭዎች በኩል፡በላይኛው የጉንጭ ክፍል እና በድድ መካከል ያስገቡ። በብልት ውስጥ ያሉ ኪኒኖች በራሳቸው ይሟሟሉ - በጉንጭ እና በድድ መካከል ያስገቡ ከሆነ፣ ደግሞ ማንኛውንም ቀሪ በውሃ ከመዋጥዎት በፊት ለ 30 ደቆዩ። የተወሰነ ደም መፍሰስ ካለ በብልት የማስገባት መንገድ ያስወግዱ። ሁለተኛው የሚሰጥረስቶል ጥቅም ላይ ካልዋለ እባክዎ በትክክለኛ መንገድ ማስወገድን በተመለከተ መመሪያ የተጻፈበትን የታካሚ መረጃ በራሪ ወረቀት ይመልከቱ። የቀሩ መድሃኒቶችን ለሌላ ማንም አይስጡ ወይም ለሌላ እርግዝና አይጠቀሙ።

አፍ ውስጥ በጉንጭ እና በድድ መካከል (ቡካል)

1 ኪኒኖቹን በአፍዎ ውስጥ ከማስቀመጥዎ በፊት፣ ውሃ በመጠጣት አፍዎን ማራስ ይመከራል ምክንያቱም ይህ ኪኒኖቹ እንዲሟሙ ይረዳል።

2 አፍዎ ውስጥ በተመችዎ በኩል ማለት በላይኛው ጉንጭ እና በድድ መካከል

ወይም በታችኛው ጉንጭ እና በድድ መካከል አራት ኪኒኖችን (በእያንዳንዱ ጎን 2) ያስቀምጡ እና ኪኒኖቹ ለ 30 ደቂቃዎች እስኪሟሙ ይጠብቁ። በደረቅ አፍ ውስጥ ሊሟሙ ስለማይችሉ፣ ውሃ ፋት ማለት አስፈላጊ ነው። በዚህ ደረጃ ላይ ኪኒኖቹን **አይዋጡ።** ከ30 ደቂቃዎች በኋላ ኪኒኖቹ ሙሉ በሙሉ ካልሟሙ፣ ትንሽ ውሃ በመጠቀም ሊውጡ ይችላሉ። ኪኒኖቹ በአፍ ውስጥ ደስ የማያሰኝ ጣዕም ሊፈጥሩ ይችላሉ።



3 ከ 3 ሰዓታት በኋላ፣ ጥሩ ስሜት እየተሰማዎት ግን ደም እየፈሰሰብዎ ከሆነ ወይም ትንሽ ነጠብጣብ/መፍሰስ ብቻ ካለዎት ተጨማሪ ሁለት (2) ኪኒኖችችን ወደ ብልት ወይም በሁለቱም ጉንጭዎችዎ በኩል፡በላይኛው የጉንጭ ክፍል እና በድድ (1) መካከል ያስገቡ። በብልት ውስጥ ያሉ ኪኒኖች በራሳቸው ይሟሟሉ - በጉንጭ እና በድድ መካከል ያስገቡ ከሆነ፣ ደግሞ ማንኛውንም ቀሪ በውሃ ከመዋጥዎት በፊት ለ 30 ደቆዩ።

የህመም ማስታገሻ

ለአጭር ጊዜ ከባድ ሊሆን የሚችል ቁርጠት እና ህመም ይሰማዎታል። በዚህ መንገድ ነው እርግዝና የሚወገደው። በቤትም የህመም ማስታገሻ መድሃኒት ሊኖርዎ ይገባል። ከክሊኒክ ወደ ቤት ሲኬድ አንዳንድ መድሃኒቶች ይሰጣሉ፤ ይሁን እንጂ ጥቂት የኢብፕሮፊን ወይ ኮኮዳመል ሊኖርዎ ይገባል። የሕክምና ታሪክዎ እና ሊፈጠሩ የሚችሉ አለርጂኖችዎ ላይ በመመርኮስ፡ ነርስ/አዋላጅ ለመጀመሪያው ህክምናዎ ስታደርጉ የተሻሉ ስለሚባሉ አማራጮች ከእርስዎ ጋር ይወያያሉ።

የህመም ማስታገሻ መድሃኒቶች ምሳሌ፡

- የህመም ስሜት ሲጀምርዎ ለመጠነኛ ህመም - 2x200mgs- ይውሰዱ ይህ በየ 4-6 ሰዓት ክፍተት መውሰድ ይቻላል (በ24 ሰዓታት ውስጥ ቢበዛ 6 ኪሂን ብቻ ይውሰዱ)።
- ፓራሲታሞል ከመጠነኛ እስከ መካከለኛ ህመም ለሚሰማቸው እና ኢብፕሮፊን መወሰድ ለማይችሉ (በ24 ሰዓታት ውስጥ ቢበዛ 8 ኪሂን ብቻ ይውሰዱ)።
- በየ 6-8 ሰዓታት ኮዲን ፎስፌት 1x30mg ይውሰዱ
- ሙቅ ውሃ የሞላ ፕላስቲክ መጠቀም (በተመረተበት ፋብሪካ መመሪያ መሰረት) ፡ ሙቀትም ህመም ስሜትን ለመቀነስ ያግዛል።

እባክዎ የሚከተለውን ያስተውሉ፡

- ኮዲን ሲወስዱ መኪና ወይም ሌላ ተሽከርካሪ አይንዱ።
- ሚሶፕሮስቶል ካስገቡ በኋላ እርግዝናው ሙሉ በሙሉ እስኪቆም እና ለመንዳት ጥሩ ስሜት እስኪሰማዎ ድረስ መኪና አያሸክርክሩ።
- በመኖሪያ ቤትዎ ጓደኛ ወይ የሚያምኑት ሰው (ከ18 ዓመት በላይ) ሊኖር እና ድጋፍ ሊያደርግልዎ ይመከራል። ይህ የሚሆነው ለደህንነቱ እና በእርስዎ እንክብካቤ ስር ላሉ ሰዎች ደህንነት ተብሎ ነው።

አስቀድሞ በህክምና መንገድ ከሚካሄድ ፅንሰ ማሰወረድ የሚጠበቁ ነገሮች እና የተለመዱ የጎንዮሽ ጉዳዮች

አብዛኛውን ጊዜ መድሃኒቱን ከወሰዱ በኋላ ከ2-12 ሰዓታት መካከል ባለው ጊዜ ውስጥ የጽንሰ መውረድ ይከናወናል። የሚፈስ ደም፣ እና የረጋ ደም እንደሚኖር ሊጠብቁ ይገባል። የመጀመሪያውን ደረጃ መድሃኒት (ሚፌፕሪስቶን) ከወሰዱ በኋላ ደም መፍሰስ ሊጀምርብዎ ይችላል።

ይህ ከተከሰተ አሁንም የሁለተኛ ደረጃን (ሚሶፕሮስቶል) መውሰድ አለብዎት። ደም መፍሰሱ ከባድ ከሆነ በጉንጭና በድድ መካከል ያስገቡ (ገጽ 20 ይመልከቱ)።

ለ4 ሳምንታት በመሃል እየቆመ እና፣ ተመልሶ የሚመጣ ደም መፍሰስ ይቀጥላል። ሚሶፕሮስቶል የተባለውን መድሃኒት ከወሰዱ በኋላ በ48 ቀን ውስጥ፣ ደም መፍሰስ ካልጀመረ፣ ወደ ድሕረ እንክብካቤ መደወል፣ እና የህክምና ባለሙያውን ማናገር ይገባል።

አንዳንድ ደምበኞች የመድሃኒቶቹ የጎንዮሽ ጉዳዮች ያጋጥማቸዋል፣ ለምሳሌ ማቅለሽለሽ እና/ወይም የራስ ምታት። በጣም ጥቂት በሆኑ አጋጣሚዎች፣ ደግሞ ፊት ይገረጣል ወይም ቆዳ ላይ ሽፍታ (ቁስል) ይወጣል።

- እነዚህ ምልክቶች መካከል አንዱን ካጋጠመዎት እባክዎ ወዲያውኑ ወደ ድሕረ እንክብካቤ መስመር ይደውሉ።

ሚፍፕሪስቶን ኪኒን ከወሰዱ በኋላ፣ በ90 ደቂቃዎች ውስጥ ካስታውሱ፣ ምናልባት መድሃኒት ደግመው መውሰድ ሊያስፈልግዎ ስለሚችል፣ ክሊኒኩን ያግኙ ወይም የድሕረ እንክብካቤ የስልክ መስመር ይደውሉ።

አንዳንድ ደምበኞች፣ ከሁለተኛው ደረጃ ህክምና አስቀድሞ በብልት ደም ሊፈሳቸው ይችላል። ይህ ካጋጠመ፡ እባክዎ ታምፖን የተባለውን ብልት ውስጥ የሚገባውን ደም ማቆሚያ በመጠቀም ፋንታ የንፅህና መጠበቂያ ፓድ ይጠቀሙ። ከከባድ የወር አበባ ጋር የሚመሳሰል መድማት የሚጠበቅ ነው። የመድማት ሁኔታው የሚያሳስብዎ ከሆነ ወይም መድሃኒቱ በጣም ካሳመምዎት ክሊኒኩን ያግኙ፣ ወይም የድሕረ እንክብካቤ የስልክ መስመር ይደውሉ።

ደም ማውጣት

የሚደማው ደም መጠን እና ዓይነት፣ ከሰው ወደሰው፣ እንዲሁም በእያንዳንዱ ፅንሰ ማስወረድ ሊለያይ ይችላል። በህክምና በታገዘ ፅንሰ ማስወረድ በሚካሄድበት ጊዜ፣ ቀለል ያለ፣ መካከለኛ ወይ ከፍተኛ መድማት የተለመደ ነው (ገፅ 25ን ይመልከቱ)። በህክምና የታገዘ ፅንሰ ማስወረድ በሚካሄድበት ጊዜ፣ ሁሉም ሴት የረጋ ደም ይፈሳታል ማለት አይደለም። ይሁን እንጂ ሲያጋጥም የረጋው ደም መጠን ከአንድ ትልቅ ሎሚን መብለጥ የለበትም። ያለመድማት/በጣም በቀስታ መድማት(ምስል 1) ወይም እንደጎርፍ መድማት (ምስል 5) የተለመደ አይደለም። ስለዚህ ከሚከተሉት ውስጥ ካጋጠመዎ በ0333 016 0400 ወደ ድሕረ እንክብካቤ ስልክ መስመር ይደውሉ፡

- ሚሶፕሮስቶልን ከወሰዱ 48 ሰዓታት በኋላ በጭራሽ ደም አይፈስዎትም፤ ነጠብጣብ ብቻ/ሲጠረጉ ብቻ ሶፍት ላይ ደም ይያያሉ (ትንሽ ደም መፍሰስ፡ ምስል 1 ይመልከቱ)
- 2 ከፍተኛ መጠን ያላቸው የንፅህና ፓዶችን በተከታታይ ለ 2 ሰዓታት የሚያጥለቀልቅ ከባድ የደም መፍሰስ ያጋጥማል ከፍተኛ ምስል 4)

እጅግ በጣም ከባድ የደም መፍሰስ እና ህመም ከተሰማዎ ወደ 999 ይደውሉ (መጉረፍ ምስል ይመልከቱ)

በተለምዶ መድሃኒት ከተወሰደ ከ2 ሰዓታት በኋላ መድማት ይጀምራል። አብዛኞቹ ሴቶች ከ2-4 ሰዓታት ባለ ጊዜ ውስጥ ይደማቸዋል። ይህ ቀለል ያለ ደም በምፍሰስ ይጀምራል፣ ይሁን እንጂ የፅንሱ መጨናገፍ እስኪያጋጥም ድረስ፣ ቀስ በቀስ እየከበደ ይሄዳል። እንዴ የፅንሰ መጨናገፋ ሲያጋጥም፣ የመድማት ሁኔታው ቀስ በቀስ እየቀነሰ ይሄዳል። ይሁን እንጂ እስከ 7-14 ቀናት (ልክ እንደ የወር አበባ) ደም እየደማዎት ይቆያሉ።

የሚቀጥለው የወር አበባ እስኪመጣ ድረስ፣ የንፅህና መጠበቂያ ፓዶ መጠቀም ይቀጥሉ። ቴምፖን የተባለው እና ብልት ውስጥ የሚቀመጠውን የደም መቆጣጠሪያ፣ የኢንፌክሽንን አደጋ ስላለው አይጠቀሙ። የንፅህና መጠበቂያ ፓዶ መጠቀም የደሙን ፍሰት ለመከታተል እና ኢንፌክሽንን ለመከላከል ይጠቅማል።

ስልክ: 0333 004 6666 ስልክ: (01) 874 0097 (አደሪሽ)


1. አነስተኛ ደም - <2.5 ሲሜ (1 ኢንች) ነጠብጣብ




2. ቀላል ደም - 2.5 ሲሜ - 10 ሲሜ (4-1 ኢንች) ነጠብጣብ




3. መካከለኛ - 10 - 15 ሲሜ (4-6 ኢንች) ነጠብጣብ



3. ከባድ



3. ጎርፍ



የአደጋ ስጋቶች/ መወሳሰቦች እና ያለመሳካት ሁኔታዎች ደረጃ

የህክምናው የአደጋ ስጋቶች እና ሊያጋጥሙ የሚችሉ መወሳሰቦችን በተመለከተ፡

በምክክራችን ግዜ በሚገባ እንነጋገርባቸዋለን።

በህክምና የሚካሄድ የፅንሰ ማስወረድ፣ አማካኝነት እርግዝናውን ማቆም የማይቻልበት ትንሽ የአደጋ ስጋት ይኖረዋል። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ላይ፣ ፅንሰ የማስወረድ ሂደቱን ለመጨረስ ተጨማሪ የህክምና እገዛዎች ማግኘት ግድ የሚሆንበት ትንሽ ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ይህም ማለት ከፅንሰ ማስወረዱ በኋላ፣ የቀዶ ጥገና እገዛ ማድረግ ያስፈልጋል።

ከዚህ ቀጥሎ የተዘረዘሩት መወሳሰቦች (ችግሮች) ሊያጋጥሙ ይችላሉ፡

- ያልተሳካ ፅንሰ ማስወረድ ፣ እንዲሁም ትንሽ የአካል ክፍሎች ማህጸን ውስጥ መቅረት (ከ100 ሰዎች ውስጥ ከ1-2 ያነሱት አጋጣሚዎች)
- በከፍተኛ ደም መፍሰስ ምክንያት ደም መለገስ (ትራንስፊዩዥን) ስለ ማስፈለግ (ከ1000 ውስጥ ከ1 ያነሱ አጋጣሚዎች)
- አንዳንድ ግዜ ኢንፌክሽን ሊያጋጥም ይችላል (ከ100 ውስጥ ከ1 ያነሱ ጉዳዮች)

(RCOG 2022)

ኢንፌክሽን

አንዳንድ ግዜ ትንሽ ቲሹ (የአካል ክፍል) ማህጸን ውስጥ ይቀራል (ከእርግዝናው ጋር አብሮ አይወጣም)፣ እንዲሁም ኢንፌክሽን ይፈጥራል። ከፍተኛ ችግሮች (መወሳሰቦች) የማስጠንቀቂያ ምልክቶች አሏቸው። ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት አንዱ ካጋጠመዎ፣ በቀጥታ በ0333 016 0400 ወደ ድሕረ እንክብካቤ መስመር ይደውሉ።

- ከፍተኛ የሙቀት መጠን እና/ወይም ትኩሳት፡ ጉንፋን መሳይ ምልክቶች ወይም ብርድ ብርድ የማለት (ማንቀጥቀጥ)
- ከ1 ሰዓት ውስጥ በተከታታይ፡ ከሁለት በላይ ትልልቅ የንፅህና መጠበቂያ ፓዶችን ያጥለቀለቀ ከፍተኛ ደም መድማት። እነዚህ ፓዶች ለከፍተኛ ደም ፍሰት ተብለው የተሰሩ መሆን አለባቸው።
- በህመም ማስታገሻ መድሃኒት፣ ወይም ሙቀት መስጫ ሊቀንስ ያልቻለ የሆድ ህመም ወይም ያለመመቸት ስሜት ።
- ከማህጸን የሚፈስ እና መጥፎ ጠረን ያለው ፈሳሽ።

ገፅ 50 ላይ ከፍተኛ የኢንፌክሽን መወሳሰብ (ሴፕሲስ)ን ይመልከቱ።

ከሚከተሉት ምልክቶች አንዱ ካጋጠመዎት፣ 999 ይደውሉ። ወይም የሚያግዝዎትን ሰው ወዲያውኑ አንቡላንስ እንዲጠሩ ያድርጉ።

ስልክ: 0333 004 6666 ስልክ: (01) 874 0097 (አደሪሽ)

- እርግዝናው ሲያልፍ፡ በየ 5-10 ደቂቃዎች ውስጥ ወፍራም የንፅህና መጠበቂያ ፓድ ከበሰበሰ፡ እንዲሁም የረጋ ደም ከአጅም መጠን በላይ ከሆነ የተለመደ አይደለም። እና በአካባቢዎ ወደሚገኘው የድንገተኛ ህክምና መስጫ ክፍል (A&E) ሊሄዱ ይገባል።
- ራስን መሳት
- ፊት ላይ፡ አፍ ላይ፡ ጉርሮ ውስጥ እብጠት ወይም የመተንፈስ ችግሮች የመሳሰለ ከፍተኛ አለርጂ።

አስቀድሞ በህክምና መንገድ የሚካሄድ ፅንሰ ማሰወረድ (EMA) ድህረ እንክብካቤ

የእርግዝናቸው ግዜ ምንም ይሁን ከ3 ሳምንታት በኋላ ደግመው፡ የእርግዝና ምርመራ እንዲያደርጉ ሁሉንም ደምበኞቻችንን እንመክራለን። በዕለቱ መጀመሪያ የሽኑትን ሽንት፡ እንደ ናሙና መውሰድ በጣም አስፈላጊ ነው። የእርግዝና መመርመሪያ መሳሪያው፡ ከነመመሪያው ከድህረ እንክብካቤ እሽግ ውስጥ ይገኛል። እርግዝና ካሁንም ፖዘቲቭ ካስመለከተ፡ ወዲያው ለክሊኒክ ሊያስታውቁ ይገባል።

የህክምና ባለሙያዎች በቀን 24 ሰዓታት ቅዳሜ እና እሁድ እንዲሁም በባንክ ሆሊዴይ፡ በማንኛውም የሚያሳስብዎ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር፡ በ0333 016 0400 የስልክ መስመር ላይ ዝግጁ ሆነው ይጠብቋችኋል።

የድህረ እንክብካቤ እገዛ መስመር

ስልክ: 0333 016 0400

ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)



በቀዶ ጥገና ፅንሰ ማሰወረድ

በቀዶ ጥገና ፅንሰ ማሰወረድ አስተማማኝ እና ቀላል ፅንሰ የማሰወረድ ሂደት ነው። እንደየጤናዎ፡ የግል ምርጫዎ እና የእርግዝና ግዜዎ የተለያየ መንገድ ጥቅም ላይ ይውላል። በቀዶ ጥገና ፅንሰ ማሰወረድ፡ ንኡስ ቀዶ ጥገና ነው፤ እንዲሁም በአንድ ቀን ውስጥ የሚካሄድ ስራ ስለሆነ አልጋ ይዘው ሌሊቱን ህክምና ጣቢያው ውስጥ ማሳለፍ አያስፈልግዎትም።

ማኑዋል ቫክዩም አስፓይሬሽን (ፅንሱን ስቦ የማውጣት ዘዴ)

ይህ እስከ 14 ሳምንት በሚደርስ እርግዝና ላይ የሚካሄድ እና ቱቦ በማህጸን በር በኩል ወደ ማህጸን ማስገባትን ያጠቃለለ መንገድ ነው። ፅንሱን ለማሰወጣት፡ የቀዶ ጥገና ባለሙያው ሲሪንጋ እና የመምጣጫ መሳሪያ ይጠቀማል።

ሂደቱ በጣም ፈጣን ነው፡ ብዙ ግዜ 10-15 ደቂቃዎች ይፈጃል። ማገገምን በተመለከተም፡ ፈጣን እና ብዙ ግዜ ትንሽ እረፍት ካደረጉ በኋላ ክሊኒኩን ለቀው ሊወጡ ይችላሉ።

በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ፡ ፅንሱን ስቦ ማሰወጣት ላይ ቀላል ማድንዘዣ መጠቀም እንችላለን። ይሁን እንጂ ይህ ከ10 ሳምንታት በታች የእርግዝና ግዜ ላይ ለምትገኝ ሴት ብቻ ነው የሚመከረው።

ዳይሌሽን ኤንድ ኢቫኩዩሽን (D&E)

ይህ መንገድ ከ14 ሳምንት በላይ ዕድሜ ላይ በሚገኝ እርግዝና ላይ የሚውል ነው። ፎርሴፕ የተባለውን ልዩ የህክምና መሳሪያ በማህጸን በር በኩል፡ ወደ ማህጸን በማስገባት፡ ፅንሱን የማውጣት መንገድን ይመለከታል።

በተለምዶ ይህ መንገድ፣ አጠቃላይ ማደንዘዣ በመጠቀም የሚከናወን ነው። ይህ ስራ ከ10-20 ደቂቃዎች ድረስ የሚፈጅ ነው።

የማዘናኛ ማደንዘዣ(CS) በመጠቀም የሚካሄድ የቀዶ ጥገና ፅንሰ ማሰወረድ

የማዘናኛ ማደንዘዣ፡ በህክምናው ሂደት ላይ እንድትዘናና እና፣ የህመም ስሜት እንዳይሰማህ የሚያደርጉ መድሃኒቶች የተጣመሩበት ነው። ጭንቀትን ይቀንሳል፣ እንዲሁም በአጭር ጊዜ ለሚካሄዱ የማህጸን ላይ ስራዎች በጣም ተስማሚው መንገድ ነው። የማዘናኛ ማደንዘዣ፡ በፍጥነት እንዲያገግሙ ያግዝዎታል። እንዲሁም ከስራው በኋላ ወዲያውኑ ወደ ዘወትር እንቅስቃሴዎ እንዲመለሱ ያደርግዎታል።

የማዘናኛ ማደንዘዣ፡ መድሃኒቶች ክንድ ላይ በሚገኝ የደምስር ወይም በእጅ ጀርባ ይሰጣሉ። እንዲሁም የህክምና ስራው በመካሄድ ላይ እያለ ክትትል ይደረጋል። ህክምናው በመካሄድ ላይ እያለ ንቁ ሆነው ሊቆዩ ይችላሉ። እንዲሁም ከነርስ እና ዶክተር ጋር ሊያወሩ ይችላሉ። ይሁን እንጂ በሰዓቱ እና ከዚያ በኋላም፣ ለተወሰኑ ሰዓታት የሚቆይ የድብታ ስሜት ሊሰማዎት ይችላል። የመዘናኛ ማደንዘዣ ከተደረገልዎ በኋላ፣ ስለህክምና ሂደቱ ምንም ላያስታውሱ ወይም በተወሰነ ደረጃ ሊያስታውሱ ይችላሉ።

ከዚያ በኋላ የማህጸን በርን ለማደንዘዝ ማደንዘዣ ይሰጣል። ለብዙ ጊዜ የማይቆይ መጠነኛ የመቆጥቆጥ ስሜት (እንደመርፌ የመውጋት) ሊሰማዎ ይችላል። እዚህ ላይ የማዘናኛ መድሃኒቶች ሊያግዙ ይችላሉ።

ከዚያ በኋላ የቀዶ ጥገና ባለሙያው ክህምናውን ይጀምራል፡ በሂደቱ መሃል ነርስ/አዋላጅ ነርስ የቅርብ ክትትል ያደርጉሎታል።

ከህክምናዎ በኋላ፡ በህክምና አባል እየታገዙ ወደ ማገገሚያው ስፍራ ተራምደው እንዲሄዱ ይደረጋሉ። በልዩ ሙያ የሰለጠኑ ሰዎች ይንከባከብዎታል እንዲሁም ሲያገግሙ ክትትል ያደርጉሎታል።

ከማደንዘዣው ተፅእኖ ወጥተው አገገመዋል ብለው ሲያስቡ ወደ ቤትዎ ይሸኛሉ።

ሃላፊነት የሚወስድ ትልቅ ሰው ፣ ወደ ቤትዎ እንዲወስድዎ እና፣ እስከሚቀጥለው ቀን አብሮት እንዲቆይ እንጠይቅዎታለን። ራስዎ መኪና፣ ወይ ሌላ ተሽከርካሪ እየነዱ መሄድ ስለማይችሉ፣ ወደ ቤት መመለሻ መጓጓዣ አስቀድመው ያዘጋጁ።

ህክምናውን እንዲደረግልዎ ፈቃድዎን እንዲሰጡ ከመጠየቅዎ በፊት፣ ከመዝናኛ ማደንዘዣ ጋር ስለተያያዙ የጎንዮሽ ጉዳዮች እና ችግሮች ዝርዝር ማብራሪያ ይደረግልዎታል።

በአጠቃላይ ማደንዘዣ የሚካሄድ የቀዶ ጥገና ፅንሰ ማሰወረድ (GA)

አጠቃላይ ማደንዘዣ (GA) በክትትል ስር ሆኖ ራስን የመሳት ሁኔታ ሲሆን፣ የሚያስተኛ መድሃኒት ይሰጥዎታል እና ስለሚካሄደው ቀዶ ጥገና ምንም አያውቁም፣ እንዲሁም በሰራው መሃል የህመም ስሜት አይሰማዎትም።

አጠቃላይ ማደንዘዣ ስራው በሚካሄድበት ሰዓት "መተኛት" ለሚመርጡ ሁነኛ ማደንዘዣ ሲሆን፣ ከ5 እስከ 23 ሳምንት እና 6 ቀን ዕድሜ ያለው እርግዝና ለተሸከሙ ሴቶች ተስማሚ ነው።

የአጠቃላይ ማደንዘዣ መድሃኒቶች ክንድ ላይ በሚገኝ የደምስር ወይም በእጅ ጀርባ ይሰጣሉ። እንዲሁም የህክምና ስራው በመካሄድ ላይ እያለ ክትትል ይደረጋል። በተጨማሪም የማደንዘዣ ባለሙያው እና ነርስ/ አዋላጅ ነርስ (ሚድዋይዩ)፣ እስከመጨረሻው ከጎንዮ ሆነው የቅርብ ክትትል ያደርጉልዎታል።

የማህጸን በርን ማለስለስ እና መክፈት (ሰርቪክል ፕራይሚንግ)

በቀዶ ጥገና ፅንሰ ማሰወረድ ከመካሄዱ በፊት፣ የማህጸን በር ሚፍፕሪስቶን፣ ሚሶፕሮስቶል እና ዲላፓን በተባለ ማህጸን ውስጥ የሚገኘውን ፈሳሽ እየሳበ በመለጠጥ፣ በሩን የሚከፍት መድሃኒት አማካኝነት ለህክምና ዝግጁ እንዲሆን ይደረጋል። ከእነዚህ መድሃኒቶች አንድ ወይም ከዚያ በላይ ያስፈልግዎ ይሆናል። በየትኛው

ስልክ: 0333 004 6666 ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)

መድሃኒት ቅድመ ዝግጅት ማድረግ እንዳለብዎ፤ እንዲሁም መቼ እና እንዴት በሚለው ላይ ማብራርያ ይሰጥዎታል።

ሚፍጥረስቶን እና ሚሶፕሮስቶል ኪኒኖች፤ የማህጸን በርን በማለስለስ በቀላሉ እንዲከፈት ያደርጋሉ። ዲላፓን የክብሪት እንጨትን የሚያክል ሆኖ፤ ከቀዶ ጥገና በፊት ማህጸን በር ላይ የሚቀመጥ ነው። ቀስ እያለ ይነፋፋ እና የማህጸን በርን ይከፍታል። መድሃኒቱ ማህጸን በር ውስጥ የሚከተተው ክሊኒክ ውስጥ ሲሆን፤ ጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ይወስዳል። ይህንን ለማድረግ በመርፌ መልክ የሚሰጥ፤ ወይም የሚረጭ ማደንዘዣ መጠቀም ያስፈልግ ይሆናል። ህክምናዎ ከሁለት ቀን በኋላ እንዲካሄድ ዕቅድ የተያዘ ከሆነ፤ መድሃኒቱ ከተከተለዎ በኋላ ወደ ቤት ይሄዳሉ። ዲላፓን እየተነፋፋ ሲሄድ፤ ቁርጠት ወይም ቀለል ያለ ደም መፍሰስ ሊያስከትል፤ እንዲሁም በጣም አልፎ አልፎ ውሃ ሊፈስ እና ወደ ፅንሰ መጨንገፍ ሊመራዎት ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ዲላፓን ሊወድቅ ይችላል። ህመም ማስታገስን በተመለከተ እንዲሁም ምጥ ከጀመረ፤ ወይም ውሃ ከፈሰሰ፤ ምን ማድረግ ይገባል በሚለው ላይ ተጨማሪ መረጃ ይሰጥዎታል።

በቀዶ ጥገና ፅንሰ መደብ የሚከሰቱ የጎንዮሽ ጉዳዮች የሚከተሉት ናቸው፡

- የማህጸን መነሳት (ከ1000 ጉዳዮች 1-4)
- የማህጸን በር መነሳት (ከ100 ጉዳዮች 1)
- ደም መስፈስ (ከ1000 ጉዳዮች 1-4)
- ኢንፌክሽን (ከ100 ጉዳዮች መሃል ከ1 ያነሰ)
- የሽል ክፍሎች ማህጸን ውስጥ መቅረት (3:100)

(RCOG, 2022)

* ሁሉም የቀዶ ጥገና ስራዎች አንዳንድ የጎን ጉዳዮች ይኖራቸዋል። ይሁን እንጂ እጅግ በጣም አስተማማኝ የሆነ አገልግሎት በመስጠት፤ ጥሩ ስም እንዳለን እና ከፍተኛ ብቃት ያላቸው የቀዶ ጥገና፤ የማደንዘዣ ባለሙያዎች እንዲሁም ነርሶች/አዋላጅ ነርሶች (ሚድዋይዩ) እንደምንቀጥር ልናረጋግጥልዎ እንወዳለን።

ከቀዶ ጥገና በኋላ የሚኖር የሰውነት እንቅስቃሴ

- በቀዶ ጥገና ጽንሰ ማስወረድን ተከትሎ ለ 24-48 ሰዓታት ለማረፍ እና ላለመጨነቅ ሊያቅዱ ይገባል
- ለምሳሌ ባቾ ለመግባት ወይ ሻወር ለመውሰድ፡ ታምፖን ለመጠቀም፡ የአካል እንቅስቃሴ ለማድረግ (ውሃ ዋናን ጨምሮ) እንዲሁም ክብደት ለማንሳት ዝግጁ ሲሆኑ ወዲያውን ወደ ዘወትር እንቅስቃሴዎ ሊመለሱ ይችላሉ። (nhs.uk, 2022)

በአጠቃላይ ማደንዘዣ አማካኝነት ፅንሰ ማስወረድ ከተካሄደ በኋላ፣ ለ24 ሰዓታት የሚንከባከብዎ ሰው እንዲያዘጋጁ እንጠይቅዎታለን።

የወሊድ መከላከያ

አጠቃላይ ማደንዘዣ ውስጥ እያሉ ኮይል፣ ወይም ማህጸን ውስጥ የሚቀበሩት መከላከያዎች እንዲደረግልዎ ከፈለጉ ይቻላል።

የማዘናኛ/ አጠቃላይ ማደንዘዣ እና ጡት ማጥባት

በማዘናኛ ማደንዘዣ ወይም አጠቃላይ ማደንዘዣ ወቅት፣ጥቅም ላይ የዋሉ ሁሉም መድሃኒቶች ወደ ጡት ወተት ያልፋሉ፣ ይሁን እንጂ ልጅን በማይጎዳ መልኩ በጣም ጥቂት በሆነ መጠን ነው። ካገገሙ በኋላ እና ዝግጁ ሲሆኑ፣ ወዲያውኑ ጡት ማጥባት ሊቀጥሉ ይችላሉ። ልጅዎ ከመጠን ያለፈ እንቅልፍ መተኛቱን ያስተውሉ። ማደንዘዣውን ከመውሰድዎ በፊት፣የጡት ወተት አልበው በማስቀመጥ፣ ከህክምናው በኋላ የጡት ወተት አቅርቦት እንዲኖር ማድረግ ይችላሉ።

ከህክምናው በኋላ

ክሊኒኩን ለቀው ከመውጣትዎ በፊት፣ የድህረ እንክብካቤ ቅድመ ዝግጅቶችን አስመልክቶ ገለጻ ይደረግባቸዋል። እንዲሁም የሚከተሉትን ነገሮች የያዘ የድህረ እንክብካቤ እሽግ ይሰጥዎታል፡

- የወሊድ መከላከያ በራሪ ወረቀት
- ኮንዶም
- የድህረ እንክብካቤ ስልክ ቁጥር

የድህረ እንክብካቤ እገዛ መስመር

ስልክ: 0333 016 0400

ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)



በቀድጥገና ፅንሰ ማስወረድ ከተካሄደ በኋላ፣ ምን መጠበቅ እንደሚቻል።

እንደ እርግዝናው ደረጃ ደም መድማት፣ ከቀላል እስከ ከባድ የወር አበባ ዓይነት ሊለያይ ይችላል። ከቀድ ጥገናው በኋላ ለ7-14 ቀናት፣ ደም መፍሰስ የተለመደ ነው። እንዲሁም ለተወሰኑ ቀናት ትንሽ የረጋ ደም ሊወጣ ይችላል። እንደ መምሪያ፣ ከራስዎ የወር አበባ ጋር ያነጻፅሩት - የሚፈስዎት ደም ከከባድ የወር አበባ የባሰ ከባድ ሊሆን አይገባም።

እርግዝናዎ ገና ከሆነ (5-7 ሳምንታት) ጥቂት ደም ይፈስዎታል። ይህ ማለት ህክምናው አልተሳካም ማለት አይደለም።

የእርግዝና ምልክቶች፣ ከሁለት ሳምንታት በላይ ከቀጠለ፣ ወደ ድሕረ እንክብካቤ መስመር ይደውሉ።

የሚቀጥለው የወር አበባ እስኪመጣ ድረስ፣ የንፅህና መጠበቂያ ፓድ መጠቀም ይቀጥሉ። ታምፑን ግን አይጠቀሙ። የንፅህና መጠበቂያ ፓድ መጠቀም፣ የደሙን ፍሰት ለመከታተል እና ኢንፌክሽንን ለመከላከል ይጠቅማል።

ደም መፍሰሱ ከ2 ሳምንታት በላይ ከቆየ፣ ወይም ካሳሰብዎት፣ እባክዎ ወደ ድሕረ እንክብካቤ መስመር ይደውሉ።

ኢንፌክሽን

በህክምናዎ መሃል 2 የተለያዩ የአንቲ ባዮቲክስ መድሃኒቶች ይሰጥዎታል (አለርጂ ከሌለብዎት)። ይሁን እንጂ እንዳንድ ግዜ በፅንሰ ማስወረዱ ግዜ፣ ያልወጡ አንዳንድ በጣም ትንንሽ የፅንሱ አካል ክፍሎች፣ ማህጸን ውስጥ ሊቀሩ እና ኢንፌክሽን ሊፈጥሩ ይችላሉ። ከፍተኛ ችግሮች (መወሳሰቦች) የማስጠንቀቂያ ምልክቶች አሏቸው።

ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት አንዱ ካጋጠመዎ፣ በቀጥታ በ0333 016 0400 ወደ ድሕረ እንክብካቤ መስመር ይደውሉ።

- ከፍተኛ የሙቀት መጠን እና/ወይም ትኩሳት፡ ጉንፋን መሳይ ምልክቶች ወይም ብርድ ብርድ የማለት (ማንቀጥቀጥ)፤
- ከ1 ሰዓት ውስጥ በተከታታይ፡ ከሁለት በላይ ትልልቅ የንፅህና መጠበቂያ ፓዶችን ያጥለቀለቀ ከፍተኛ ደም መድማት። እነዚህ ፓዶች ለከባድ ፍሰት ተስማሚ መሆን አለባቸው።
- በህመም ማስታገሻ መድሃኒት ወይም ሙቀት መስጫ ፓዶ ሊቀንስ ያልቻለ የሆድ ህመም፣ ወይም ከውር አበባ ህመም በላይ የከበደ ያመመቸት ስሜት ።
- ከማህጸን የሚፈስ እና መጥፎ ጠረን ያለው ፈሳሽ።

ገፅ 50 ላይ ከፍተኛ የኢንፌክሽን መወሳሰብ (ሴፕሲስ)ን ይመልከቱ።

የድሕረ እንክብካቤ እገዛ መስመር

ስልክ: 0333 016 0400

ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)



የቅድመ ቀዶ ጥገና ምክር

ሊታወሱ የሚገባቸው ነገሮች

ክሊኒክ ከመሄድዎ በፊት እነዚህ ትእዛዞች መከተል ያስፈልጋል፡ ካልተከተሏቸው ህክምናዎ ሊዘገይብዎ ይችላል። ወይም አንዳንድ ግዜ ሊሰረዝ ይችላል።

በሁሉም ምርመራዎች ላይ፡ አስቀድሞ በህክምና እና በቀዶ ጥገና የሚካሄድ ፅንሰ ማስወረድ ሲካሄድ እነዚህን ትእዛዞች ሊከተሉ ይገባል፡

- ልቅ እና ምቹ የሆነ ልብስ ይልበሱ
- በሃኪም የታዘዘልዎትን መድሃኒት እና የመተንፈሻ መሳሪያዎች (ኢንሄለር) ዝርዝር ይዘው ይምጡ
- የታዘዘልዎ መድሃኒት ካለ እንደተለመደው መውሰድ ይቀጥሉ
- የሚከተሉት መድሃኒቶች ከታዘዘልዎ እባክዎን ያነጋግሩን፤ አስፕሪን፣ ዋርፋሪን ወይም ክሎፒዶግራል (ፕላቪክስ)
- የንፅህና መጠበቂያ ፓዶችን ይዘው መምጣት ያስፈልጋል (ታምፖን አያምጡ)

በአጠቃላይ ወደ በማዝናኛ ማደንዘዣ አማካኝነት፣ በቀዶ ጥገና ፅንሰ ማስወረድ የሚካሄድልዎ ከሆነ የሚከተሉትን ተጨማሪ ትእዛዞች ይከተሉ፡-

- ህክምናው 2 ሰዓት እስኪቀረው ድረስ ንጹህ ፈሳሽ (ውሃ) ብቻ ይጠጡ።
- ህክምናው 6 ሰዓት ሲቀረው ምግብ አይመገቡ።
- ከህክምናው በኋላ ለ24 ሰዓታት የሚንከባከብዎ ሰው መኖሩን ያረጋግጡ።

- ከህክምናው ከመካሄዱ በፊት፣ እና ከህክምናው በኋላ ለ24 ሰዓታት እንዳያጨሱ እንመክራለን
- ጋውን ልብስ እና ነጠላ ጫማ (ስሊፐር) ይዘው ይምጡ
- ከቀዶ ጥገና በፊት እባክዎን ሁሉንም የፊት እና የሰውነት ጌጦችን፣ ሜካፕ እና የጥፍር ቫርሲቭ ያስወግዱ
- ከህክምናዎ በፊት፣ ሁሉንም የዓይን ውስጥ መነፅሮችን (ኮንታክት ሌንስ) ያውጡ
- ከቀዶጥገና አስቀድሞ በነበረው 48 ሰዓታት ውስጥ ህመም ከተሰማዎት፣ ክሊኒኩን ያስታውቁ። ምክንያቱም ሌላ ቀጠሮ መያዝ ያስፈልግ ይሆናል።

የድሕረ እንክብካቤ እገዛ መስመር

ስልክ: 0333 016 0400

ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)



አስቀድሞ በህክምና እና በቀዶ ጥገና የሚካሄድ ፅንሰ ማሰወረድ ድሕረ እንክብካቤ

ፅንሰ ካስወረዱ በኋላ የሚከተሉትን ሊያደርጉ ይችላሉ፡

- ✓ ለህመም ወይም ምችት ማጣት ችግሮች አይቡፕሮፊን ወይም ፓራሲታሞል ይውሰዱ
- ✓ ደም መፍሰስ እስኪቆም ድረስ ከታምፖን ይልቅ የንፅህና ፎጣዎችን ወይም ፓዶችን ይጠቀሙ (እና ስለዚህ የደም መፍሰሱን ለመከታተል ያስችልዎታል)
- ✓ ዝግጁ ነኝ ብለው ሲያስቡ ወዲያውኑ ወሲባዊ ግንኙነት ያድርጉ፡ ግን እንደገና ማርገዝ ካልፈለጉ የእርግዝና መከላከያ ይጠቀሙ፤ ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ ከጽንሰ ማሰወረድ በኋላ ወዲያውኑ ማርገዝ ይችላሉ
- ✓ አብዛኛውን ጊዜ ምችት ሲሰማዎ ወዲያውኑ ወደ ተለመደው እንቅስቃሴ ሊመለሱ ይችላሉ። ለምሳሌ በባቾ ወይም በሻወር መታጠብ፣ ታምፖኖችን መጠቀም፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ (መዋኘትን ጨምሮ) እና ክብደት ማንሳት (ኤንኤችኤስ.ዩኤ፣ 2022)

! እጅግ በጣም ከባድ መድማት ካጋጠመዎ፣ እና ከታመሙ 999 ይደውሉ (ስለ ማጥለቅለቅ ምስል 5ን ይመልከቱ)

የሚከተሉት ነገሮች ካጋጠመዎ ይደውሉልን፡

- ! በሰዓት ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ከፍተኛ-መጠን ያላቸው የንፅህና ፎጣዎችን በመጠቀም ፣ማለት በተከታታይ ለ 2 ሰዓታት ይምጡ፡ (እርስዎ መጠበቅ ያለብዎት የደም መጠን እና ዓይነትን በተመለከተ ምክር ገጽ 25 ን ይመልከቱ)
- ! ያልተለመደ፣ ደስ የማይል ሽታ የሚያስከትል የብልት ፍሳሽ መፈጠረ

ስልክ: 0333 004 6666 ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)

- ❗ ከ 24 ሰዓታት በኋላ ትኩሳት ወይም የጉንፋን መሰል ምልክቶች መፈጠር
- ❗ በሕክምና ያልተረጋገጠ ያለበታው የተቀመጠ እርግዝናን ሊያመለክት የሚችለውን ጨምሮ፣ እየባሰ ይሚሄድ ህመም ያጋጥማል (ለምሳሌ፣ የታችኛው የሆድ ክፍል ህመም በአንድ ጎን ብቻ፣ ከጊድን አጥንት ስር ወይም ወደ ትኩሻዎች የሚሄድ ከሆነ)
- ❗ ሚሶፕሮስቶልን (2ኛ ደረጃ መድሃኒት) ከወሰዱ 48 ሰዓታት በኋላ በንፅህና ፎጣ ወይም በሙታንታ ላይ የደም ነጠብጣብ ወይም ትንሽ ደም መፍሰስ ብቻ ሲኖር
- ❗ ጽንሰ ካስወረዱ ከ 1 ሳምንት በኋላም እርጉዝ ስሜት ይሰማዎታል (RCOG፣ 2022)

የግብረሰጋ ግንኙነት

ዝግጁ መሆንዎ ሲሰማዎ ጾታዊ ግንኙነት ያድርጉ፣ ይሁን እንጂ ደግመው ማርገዝ ካልፈለጉ የወሊድ መከላከያ ይጠቀሙ። ምክንያቱም ከፅንስ ማስወረድ በኋላ ሰውነትዎ ወዲያውኑ ለእርግዝና ዝግጁ ይሆናል (nhs.uk, 2022)

እባክዎ የወሊድ መከላከያ አማራጮችዎን በተመለከተ ገፅ 12 ላይ ይመልከቱ፡

የጡት ህመም እና ማፍሰስ

ከህክምናዎ በፊት የጡት ህመም ይሰማዎ ከነበረ ስሜቶቹ እስኪቀንሱ ድረስ፣ ሳምንት ወይ ከዚያ በላይ ሊፈጅ ይችላል። እባክዎ ከ2 ሳምንታት በኋላም ህመሙ የሚሰማዎት ከሆነ፣ ወደ ድሕረ እንክብካቤ መስመር ይደውሉ።

12 ሳምንታት በታች ያስቆጠረ እርግዝና ያላቸው ደምበኞች፣ ጡቶቻቸው ሲያፈሱ ማየት ያልተለመደ ነው። እባክዎ ይህ አሳሳቢ ከሆነብህ፣ ምክር ለመጠየቅ ይደውሉ። ጡት ላይ የህመም፣ መጠጠር ከተሰማዎት፣ ሙቀት እና የተቃጠለ/ቀይ ስፍራ ካለው፣ ኢንፌክሽን ተፈጥሯል ማለት ነው። እባክዎ የድሕረ እንክብካቤ መስመር ወይም ጂ.ፒ.ዎን ያግኙ።

ህመም/ማቅለሽለሽ

ከህክምናዎ በፊት ህመም ወይም ማቅለሽለሽ ይሰማዎ ከነበረ ስሜቶቹ እስኪ ቀንሱ ድረስ፤ ሳምንት ወይ ከዚያ በላይ ሊፈጅ ይችላል። የሚወስዱትን መድሃኒት እራሱ ሊያሳምምዎ ይችላል። ይሁን ንእንጂ በ2 ሳምንታት ውስጥ ምንም መሻሻል ካልታየ ወደ ድሕረ እንክብካቤ ይደውሉ።

ማሽከርከር

አጠቃላይ ማደንዘዣ ወስደው ከነበረ ቢያንስ ለ48 ሰዓታት መኪና አይንዱ። እባክዎ ይህን በተለመለከተ ከኢንሹራንስ ድርጅትዎ ጋር ይነጋገሩ። የትራፊክ አደጋ ካጋጠመዎት፣ ኪሳራ በኢንሹራንስ ድርጅት ላይሸፈንልዎት ይችላል።

ከቁኔ ውጭ መጓዝ/የአረፍት ሽርሽር (ሆሊዴይ)

የእርግዝና ምርመራ እስኪያደርጉ እና የ4 ሳምንት የክትትል (ቼክ አጥ) ምርመራ እስኪደረግልዎ ድረስ፣ ወደየትም ቦታ መጓዝ የሚመከር አይደለም። ሳያሳውቁ ከተጓዙ፣ እና በጉዞ ወቅት ችግር ካጋጠመዎ፣ የኢንሹራንስ ድርጅትዎ ወጪዎችዎን ሊሸፍንልዎ አይችልም። የኢንፌክሽን አደጋ ስለሚያሰጋ፣ ለ4 ሳምንታት ዋና መዋኘት አይመከርም።

እባክዎን ልብ ይበሉ — የጽንሰ ማስወረጃ መድሃኒት ከሀገር ውጭ መውሰድ ህገወጥ ተግባር ነው።

ከህክምና በሁላ የሚደረግ ክትትል

በ4 ሳምንት ውስጥ ክትትል እንዲደረግልዎ ይመከራል። ክትትሉ አካባቢዎ በሚገኘው የወሊድ መከላከያ እና ጾታዊ ጤንነት (CASH) ክሊኒክ፣ ወይም በዶክተርዎ ሊደረግ ይችላል።

የእርግዝና ምርመራዎችን ደግመው ማድረግ

ህክምናው መሳካቱን ለማረጋገጥ፣ የግድ በ3 ሳምንት ውስጥ የእርግዝና ምርመራ ደግመው ሊያደርጉ ይገባል። በዕለቱ ጠዋት መጀመሪያ የሽኑትን ሽንት እንደ ናሙና መውሰድ በጣም አስፈላጊ ነው። የእርግዝና መመርመሪያው በሚሰጥዎት የድህረ እንክብካቤ እሽግ ውስጥ ይገኛል። ውጤቱ እርግዝና መኖሩን ካሳየ፣ ወዲያውኑ ክሊኒኩን ወይ የድህረ እንክብካቤ መስመርን ያግኙ፣ እና ተከታይ ቀጠሮ እናስይዝልዎታለን። ቀጥሎ የሚደረገው የአልትራሳውንድ ስካን ውጤት ፅንሰ ማስወረድ አለመሳካቱን ካሳየ፣ እና አሁንም እርጉዝ ከሆኑ፣ በቀዶ ጥገና ፅንሰ ማስወረድ እንዲካሄድ ሊመቻችልዎ ይችላል። አስቀድመው ከወሰዱት መድሃኒቶች ጋር በተያያዘ የአደጋ ስጋት ስላለ፣ በእርግዝናው እንዲቀጥሉ አይመከርም።

በቀዶ ጥገና ፅንሰ ማስወረድ ከተካሄደልዎ፣ የእርግዝና ምርመራ አይደረግልዎትም ምክንያቱም የያለመሳካት ዕድሉ በጣም አናሳተኛ ስለሆነ። ይሁን እንጂ የእርግዝና ምልክቶች ከ 2 ሳምንታት በኋላም ካልጠፋ እና/ወይም አሁንም እርጉዝ እንደሆኑ ከተሰማዎት፣ እባክዎ የድህረ እንክብካቤ ክፍልን በ 0333 016 0400 በመደወል ምክር ይጠይቁ።

ለመተማመን ያህል የራስዎን የእርግዝና ምርመራ ማካሄድ ከፈለጉ፣ ፅንሰ ማስወረድ ከተካሄደልዎ በኋላ 4 ሳምንታት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ቢያደርጉት እንመክራለን።

የድህረ እንክብካቤ እገዛ መስመር

ስልክ: 0333 016 0400

ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)



ባልታወቀ ስፍራ የሚገኝ እርግዝና (PUL) እና ከማህጸን ውጪ የሚፈጠር እርግዝና

አወንታዊ የእርግዝና ምርመራ ውጤት ተገኝ ማለት፣ እርጉዝ ነዎት ማለት ነው። ይሁን እንጂ በአልትራሳውንድ ስካን አማካኝነት፣ እርግዝናውን ማየት ወይ መለየት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ይህ የተለመደ ነገር ነው። ምክንያቱም የእርግዝና ምርመራ እርግዝና መኖሩን ለማረጋገጥ የሆርሞን መጠን 10ሚ.ሊ.ሀ/ሚ.ሊ. መኖሩን ማሳየት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። እርግዝናውን ለማየት፣ በሆድ የሚደረግ ስካን ውስጥ እንዲዘልቅ የሆርሞን መጠኑ 1500ሚ.ሊ.ሀ/ሚ.ሊ. አካባቢ ሊደርስ ይገባል። በስካን መሳሪያ አማካኝነት የመጀመሪያውን እርግዝና ማግኘት የሚቻለው፣ 4 ሳምንት እና 6 ቀናት ማለት ወደ 5ኛ ሳምንት አካባቢ ላይ ነው። እርግዝናው በስካን እስኪለይ ድረስ፣ ህክምና መስጠት አይቻልም።

በአንዳንድ ሁኔታዎች እርግዝናው፣ ከማህፀን ውጭ በመኖሩ ምክንያት በስካን ሚደረግ ፍተሻ ላይገኝ ይችላል። ይህ ሁኔታ "ኤክቶፒክ" ወይም ከማህጸን ውጪ እርግዝና በመባል ይታወቃል። 'ኤክቶፒክ' ማለት ያለበታ መቀመጥ ማለት ነው።

ያለበታው የተቀመጠ እርግዝና ከ100 ሴቶች 1 ላይ ያጋጥማል። ስለዚህ እጅግ በጣም አልፎ አልፎ ነው የሚያጋጥመው። አብዛኛውን ጊዜ በስካን ሊታይ የማይችል እርግዝና፣ በጣም ገና/ ወይም ትንሽ ሲሆን ነው። እርግዝናዎ ያለበታው የተቀመጠ እርግዝና ሆኗል ብለው ካሰቡ፣ የድንገተኛ አደጋ ህክምና ማለት A&Eን መጎብኘት ይኖርብዎታል።

ያለበታው የተቀመጠ እርግዝና ምልክቶች ምንድናቸው?

እርግዝናው በ4 እና 10 ሳምንታት ዕድሜ ውስጥ እያለ ምልክቶቹ ሊፈጠሩ ይችላሉ።

ስልክ: 0333 004 6666 ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)


ምልክቶቹ ከሚከተሉት አንዱን ወይ ከዚያ በላይ ሊያጠቃልል ይችላል፡

- ሆድ ላይ በአንድ ጎን ታችኛው ክፍል የሚፈጠር ህመም። ምናልባት አንድ ግዜ የሚሰማ ስቃይ ወይም በቀናት ውስጥ ቀስ በቀስ እየጨመረ የሚሄድ የውጋት ህመም ሊሆን ይችላል። የከበደ ሊሆን ይችላል።
- አንዳንድ ግዜ በብልት ደም ሊፈስ ይችላል ግን ሁልጊዜ አይደለም። በወር አበባ ወቅት ከሚፈስ ደም ጋር የሚለይ ነው። ለምሳሌ፡ ከተለመደው የወር አበባ በተለየ የደሙ ፍሰት የከበደ ወይ የቀለለ ሊሆን ይችላል። የደሙ ቀለም ጥቁር ያለ ሊሆን ይችላል። ይሁን እንጂ የደም ፍሰቱ የዘገየ የወር አበባ ነው ብለው ሊያስቡ ይችላሉ።
- ሌሎች ምልክቶች ሊከሰቱ ይችላሉ ለምሳሌ ተቅማጥ፡ ራስን የመሳት ስሜት ወይም ሰገራ ሲገፋ የህመም ስሜት መሰማት።
- የትከሻ ህመም ሊከሰት ይችላል። ይህ ደም ወደ ሆድ ዘልቆ በመግባት ለመተንፈስ የሚያስችለንን ጡንቻ (ዳያፍራም)ን ሲያስቆጣ የሚከሰት ነው።
- ከፍተኛ ሕመም ወይም "መውደቅ"። የደም ፍሰቱ ከፍተኛ ስለሆነ፣ ሁኔታው አስቸኳይ ህክምና የሚያስፈልገው ነው።
- አንዳንድ ጊዜ እንደ ህመም የመሳሰሉ የማስጠንቀቂያ ምልክቶች ሳይኖሩ፣ ድንገት በሚያጋጥም የውስጠ ደም መፍሰስ መውደቅ ሊከተል ይችላል። ይህ ደግሞ ያለባታው የተቀመጠ እርግዝና መኖሩን የሚያሳይ የመጀመሪያ ምልክት ነው።

ከ7-14 ቀናት ውስጥ በድጋሜ ሰካን እንዲደረግልዎ ከተነገርኩ እና በዚህ መሃል ግን ከእነዚህ ምልክቶች አንዱ ከተከሰተ **የግድ** ወደ ድንገተኛ ህክምና (A&E) ሊሄዱ ይገባል።

ያለባታው የተቀመጠ እርግዝና የት ያድጋል?

አብዛኞቹ ያለባታቸው የተቀመጡ እርግዝናዎች የሚፈጠሩት፣ የወንዴ ዘር የገባበት እንቁላል በፋሎፒያን ቲዩብ ተብሎ በሚጠራው የስውነት ክፍል ግድግዳ ላይ ሲጣበቅ ነው። እጅግ በጣም አልፎ አልፎ ያለባታው የተቀመጠ እርግዝና፣ ሌሎች ቦታዎች ላይ፣ ማለት በአቫሪ ውስጥ ወይም ሆድ ውስጥ ሊፈጠር ይችላል።



የድህረ እንክብካቤ እገዛ መስመር

ስልክ: 0333 016 0400

ስልክ: (01) 874 0097 (አደሪሽ)



ስልክ: 0333 004 6666 ስልክ: (01) 874 0097 (አደሪሽ)

ቼነስ ትሮምቦኤምቦሊዝም (VTE)

ቼነስ ትሮምቦሊስ ምንድነው?

ትሮምቦዴሲስ ማለት፡ በደም መላሽ እና ደም ቀጂ ቧንቧዎች (ቼን እና አርተሪ) ውስጥ የደም መርጋት ማለት ነው። ቼነስ ትሮምቦዴሲስ በደም መላሽ ቧንቧ (ቼይን) ውስጥ ይከሰታል። ቼይን ወደ ልብ እና ሳምባዎች ደም የሚያስገባ የደም ስር ሲሆን፡ አርተሪ ደግሞ ደም ከልብ እና ሳምባ ይወስዳል።

ዲፕ ቼይን ትሮምቦዴሲስ (DVT) ፡ የእግር በታችኛው ክፍል ጀርባ የሚገኝ ጡንቻ፣ ወይም ዳሌ ውስጥ በጥልቅ የሚገኝ ቼይን ውስጥ የሚከሰት የደም መርጋት ሁኔታ ነው።

ለምን እኔ የአደጋ ስጋት ላይ ሆንኩኝ?

እርግዝና በዲፕ ቼይን ትሮምቦዴሲስ (DVT) የመያዝ ዕድልን ይጨምራል። ይሁን እንጂ ቼነስ ትሮምቦዴሲስ ከ1000 ሴቶች 1 ወይ 2 ሴቶች ላይ የሚያጋጥም ስለሆነ፣ በእርግዝና ወቅት እንዲሁም ከውልደት በኋላ በመጀመሪያዎቹ 6 ሳምንታት የሚታይ አይደለም። በእርግዝናዎ ወቅት ዲፕ ቼይን ትሮምቦዴሲስ (DVT) በማንኛውም ጊዜ ሊከሰት ይችላል።

ዲፕ ቼይን ትሮምቦዴሲስ (DVT) ለምን አደገኛ ሆነ?

ቼነስ ትሮምቦዴሲስ፡ የረጋው ደም ሊሰባበር እና ወደ ደም ስር ገብቶ፣ እንደ ሳምባ ያሉ ሌሎች የአካል ክፍሎች ውስጥ ገብቶ እስኪቀመጥ ድረስ ሊጓዝ ስለሚችል፣ በጣም አደገኛ ያደርገዋል። ይህ ሁኔታ ፕልምናሪ ኢምቦሊዝም (PE) ይባላል፣ለህይወት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል።

የዲፕ ቼይን ትሮምቦዴሲስ (DVT) ምልክቶች የሚከተሉት ሊሆኑ ይችላሉ፡

- የእጅ ወይ እግር ማበጥ
- በእግር ታችኛው ክፍል የሚገኝ የኋላ ጡንቻ ላይ ህመም ወይ የመጠጠር ስሜት
- እጅ/እግር ላይ እየጨመረ የሚሄድ ሙቀት ወይም መቅላት

ከእነዚህ ምልክቶች አንዱ ሲያጋጥምዎ፣ ወዲያውኑ እገዛ ሊጠይቁ ይገባል።

ዲፕ ቬይን ትሮምቦዴሲስ (DVT)ን መመርመር እና መታከም የፕልሞናሪኤምቦሊዝም (ፒኤ) የመከሰት አደጋን ይቀንሳል።

የፕልሞናሪ ኤምቦሊዝም (PE) ምልክቶች የሚከተሉትን ያካትታል፡

- በጣም መታመም
- በድንገት መውደቅ
- ምክንያቱ ያልታወቀ ድንገተኛ ትንፋሽ ማጠር
- የደረት ህመም/ ደረት የመጨምደድ ስሜት
- ደም የተቀላቀለበት ሳል

በዲፕ ቬይን ትሮምቦዴሲስ (DVT) /ፕልሞናሪ ኤምቦሊዝም (PE) የመያዝ ስጋት የሚጨምረው ምንድነው?

ከሚከተሉት አንዱ ከሆኑ ለደም መርጋት አደጋ ተጋላጭ ነዎት፡

- ከ35 ዓመት በላይ
- የክብደት ጠቋሚ (BMI) ከ30 በላይ የሆነ የሰውነት ክብደት
- አጫሽ
- አስቀድሞ ሶስት ወይም ከዚያ በላይ እርግዝና የነበራት
- ከዚህ በፊት ቬይን ትሮምቦዴሲስ የነበራት/ በቤተሰብ የቬይን ትሮምቦዴሲስ ታሪክ ያላት
- እንደ ልብ በሽታ፣ የሳንባ በሽታ፣ ወይም አርተራይቲስ የመሳሰሉ የጤና እክሎች
- ቫሪኮስ ቬይን (የእግር ላይ ቬይን) ህመም ወይም ከጉልበት በላይ መቅላት/ዕብጠት
- በሰውነት ውስጥ፣ በቂ ፈሳሽ አለመኖር ወይም በእርግዝና ግዜ በሚነሳ ማጥወልወል ብዙ ያለመንቀሳቀስ

ስልክ: 0333 004 6666 ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)

- ለረጅም ጊዜ ወይም ለ4 ሰዓታት፣ ወይ ከዚያ በላይ (በአየር፣ መኪና ወይም ባቡር) በመጓዝ ምክንያት ሳይንቀሳቀሱ መቆየት

በቪዲዮ ትሮፖላክምባሊዝም የመጋለጥ አደጋ እንዳለብዎ ከታወቀ፣ የደም ማቅጠኛ መርፌ እንስጥዎታለን፣ እንዲሁም ቀዶ ጥገና ሊደረግልዎ ከሆነ፣ ጥብቅ አድርጎ የሚይዝ የእግር ካልሲ (ስቶኪንግ) እንስጥዎታለን።

የድህረ እንክብካቤ እገዛ መስመር

ስልክ: 0333 016 0400

ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)



የኢንፌክሽን መወሳሰብ (ሴፕሲስ) በተመለከተ መረጃ ለደምበኞች እና ተንከባካቢዎች

ሴፕሲስ ምንድነው?

ሴፕሲስ ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲሆን፣ ሰውነት ለኢንፌክሽን ምላሽ ሲሰጥ የራሱን ክፍሎች እና ብልቶች የሚጎዳበት ነው። ኢንፌክሽን ጥቃቅን ተዋሃስያን ወይም «ጀርሞች» (አብዛኛውን ጊዜ ባክቴሪያ) ሰውነትን በመውረር የሚከሰት ነው እና በተወሰነ የሰውነት ክልል (ለምሳሌ የፕርስ እባጭ) ላይ ተወስኖ ሊቆይ ይችላል ወይም በደም ውስጥ ይበልጥ ሊሰፋፋ ይችላል (ብዙውን ጊዜ «ሴፕቲሴሚያ» ወይም «የደም መመርዝ» ይባላል)።

ሴፕሲስ ልክ እንደ ልብ ድካም እና/ወይም ስትሮክ አስቸኳይ እርዳታ የሚያስፈልገው ነው። ሴፕሲስ ያለባቸው በሽተኞች፣ የልብ ድካም ወይም ስትሮክ ካለባቸው በሽተኞች የበለጠ በ5 ዕጥፍ የመሞት ዕድል አላቸው። ቀደም ብሎ ከተገኘ፣ ለአብዛኛዎቹ ታካሚዎች የመፈወስ እድል ቡዙ ነው። ነገር ግን የህክምና እርዳታ ለማግኘት አለመዘግየቱ በጣም አስፈላጊ ነው። ሴፕሲስ በተለይ ገና በጠዋቱ ካልታወቀ እና ወዲያውኑ ካልታከመ፣ የደም ግፊት ወደ አደገኛ ማነስ ሁኔታ ይፈጠራል (ሾክ) ፡ የአካል ክፍሎች ስራ ማቆም እና ሞት ሊመራ ይችላል። ሴፕሲስ ያለባቸው ታካሚዎች፣ፈጣን ምርመራ እና አያያዝ ለስኬታማ ህክምና በጣም አስፈላጊ ናቸው።

እኔ ለምን የአደጋ ስጋት ላይ ሆንኩኝ?

ቶሎ ካልታወቀ እና በጊዜው ካልታከም፣ ሁሉም ሰው በቀላል ኢንፌክሽን የተነሳ(ለምሳሌ በ'ጉንፋን' የሽንት ከረጢት ኢንፌክሽን፣ ጋስትሮኤንትራይተስ፣ የመተንፈሻ ከረጢቶች ኢንፌክሽን ወዘተ) በሴፕሲስ የመያዝ አደጋ ተጋላጭ ነው። ከህክምናዎ በፊት ወይም በኋላ ማንኛቸውም ምልክቶች (ከዚህ በታች ይመልከቱ) ካለዎት እባክዎን ወዲያውኑ ያሳውቁን።

የሴፕሲስ ምልክቶች

የሴፕሲስ ምልክቶች ብዙውን ጊዜ በፍጥነት ያድጋሉ እንዲሁም የሚከተሉትን ሊካያካትቱ ይችላሉ፡

- እጅግ ከፍተኛ የሰውነት መንቀጥቀጥ፣ እና የጡንቻ ህመም።
- ከብልት የሚፈስ ፈሳሽ መቀየር እና/ወይም፣ ወጥነት የሌለው የብልት ደም መፍሰስ ከታችኛው ሆድ/ጀርባ ህመም ጋር ወይም ያለ ህመም። ምንም ሽንት ያለመሸናት (ማለት ቀደም ስለ 12-18 ሰዓታት)
- ሲቆሙ እያዘረ እንደመውደቅ የሚያሰኝ ዝቅተኛ የደም ግፊት።
- እንደ ድንግርግር ማለት፣ እና ግራ የመጋባት ያለ የአንጎል ትኩረት ማነስ።
- ቀዝቃዛ፡ የሚያጣብቅ እና/ወይም ጠቃጠቆ ወይ ሽንተረር ያለው/ የገረጣ ቆዳ።

እባክዎ ፅንሰ ካስወረዱ በኋላ፣ በ6 ሳምንታት ውስጥ ከእነዚህ ምልክቶች አንዱ ከተከሰተ፣ 24 ሰዓት ክፍት በሆነው የእገዛ መስመር ይደውሉ። ጂ.ፒ.ዎን ያናግሩ ወይም ወደ ድንገተኛ አርዳታ አገልግሎት ይሂዱ።

ህክምና

- ኢንፌክሽንን ለማከም አንቲ ባዮቲክስ መጠቀም። ይህ በቤት ውስጥ ወይም በሆስፒታል ውስጥ ሊሆን ይችላል። እንደ ኢንፌክሽን ክብደት ይወሰናል።
- ምንጩን መቆጣጠር- ይህ ማለት እንደ የድድ እብጠት ወይም የቁስል ኢንፌክሽን የመሳሰሉትን፣ እና ምንጭ ሊሆኑ የሚችሉትን ማከም ማለት ነው።
- ፈሳሾች- በደምስር ቱቦ በማስገባት(ጠብታ) መስጠት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል።
- ኦክሲጅን- በሴፕሲስ ዋና ዋና የአካል ክፍሎች ከተጠቁ ለምሳሌ መተንፈሻ እና/ወይም የደም ግፊት። ኢንፌክሽኑ እየታከመ ሳለ ምናልባት ሆስፒታል ልዩ አርዳታ መስጫ ክፍል (አይ ሲ ዩ) በማስተኛት፣

የአንቲ - ዲ መርፌ

(ከ 10 ሳምንታት በላይ ለሚደረግ ህክምናዎች ብቻ)

በአብዛኛዎቹ ሰዎች ላይ ርሄሰስ (አር ኤች) የተባለ የደም ዓይነት ይገኛል። በአልም አቀፍ ደረጃ 85% ያህሉ አር ኤች ፖዘቲቭ ሲሆኑ የቀሩት አር ኤች ኔጌቲቭ ናቸው።

አር ኤች ነጋቲቭ የሆነች ሴት እርጉዝ ብትሆን፣ እና የልጁ አባት አር ኤች ፖዘቲቭ ከሆነ፣ ልጁ አር ኤች ፖዘቲቭ የመሆን ጠንካራ እድል አለ ። (እዚህ ደረጃ ላይ፣ የልጁ የደም ዓይነት (Rh factor) ምን እንደሆነ መለየት አንችልም)።

ከልጅ ወደ እናት ደም ዝውውር አር ኤች ፖዘቲቭ ሴቶች ከገቡ፣ ሰውነትዋ ልክ ኢንፌክሽንን እንደሚከላከል፣ ባእድ የሆነውን አር ኤች ፖዘቲቭ ሴቶችን ለማጥፋት፣ አንቲቦዲ (አንቲ ዲ) የተባለውን ልዩ ሴል የፈጥራ።

አንቲ ቦዲዎቹ አንድ ግዜ እንዲፈጠሩ ከተፈቀደላቸው፣ እስከቀጣይ እርግዝናዎች እና ሙሉ ዕድሜ በእናት ደም ውስጥ ይቆያሉ።

የአር ኤች ፖዘቲቭ ሴቶች፣ ወደ ሴትየዋ ደም በብዙ መንገዶች ሊገቡ ይችላሉ፡

- በተለመደው ልጅ የመውለጃ ግዜ
- ከፅንሰ መጨናገፍ በኋላ
- ብስህተት የደም ልገሳ

የደም ምርመራ አር ኤች ነጋቲቭ መሆንዎን ካሳዩ፣ እና እርግዝናዎ 10 ሳምንት እና በላይ ከሆነ፣ ከቀዶ ጥገና በኋላ የአንቲ ዲ መርፌ ይሰጥዎታል። ይህ በደም ዝውውርዎ ውስጥ የገባን፣ ማንኛውንም የአሬች ፖዘቲቭ የደም ሴቶች ያጠፋል።

ይህ የራስዎ አንቲ- ዲ ከመፈጠር ይከለክላል፤ እንዲሁም ለወደፊቱ ከሚፈጠር እርግዝና ጋር የተያያዙ ችግሮችን ያስወግዳል።

አር ኤች ነጋቲቭ በመሆንዎ፤ የማይገባ ስጋት ሊያድርብዎ አይገባም። ከዚህ በፊት ልጆች ከነበሩዎት፤ ምናልባት ከወለዱ በኋላ አንቲ-ዲ ተሰጥቶት ሊሆን ይችላል። ይህ የመጀመሪያ እርግዝናዎ ከሆነ፤ የሚሰጉበት ምክንያት የለም። ሁሉም አር ኤች ነጋቲቭ ያላቸው ሴቶች፤ በእርግዝና ወቅት ሆስፒታል ውስጥ በቅድመ ወሊድ ክሊኒክ ቀጣይ ክትትል ይደረግላቸዋል። የልጁ የደም ዓይነትም ይመረመራል። ልጁ አር ኤች ነጋቲቭ ከሆነ የአንቲ-ዲ መርፌ መወጋት አያስፈልግም።

ይህ ማለት ግን ቀጥለው የሚፈጠር ማንኛውም እርግዝና፤ በሙሉ አር ኤች ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት አይደለም። ይህ ሊሆን የሚችለው፤ ጓደኛዎ አር ኤች ፖዘቲቭ ሲሆን ብቻ ነው።

ፅንሰ እንዲወርድ ከተደረገ፤ ወይም ፅንሰ ከተጨናገፈ በኋላ፤ የልጁ የደም ዓይነት ስለ ማይታወቅ የአንቲ-ዲ መርፌ መወጋት አስፈላጊ ነው። ከእርግዝና በኋላም እንደየልጁ የደም ዓይነት አንቲ-ዲ ሊሰጥ ይችላል። ምንግዜም ከዶክተርዎ ጋር በመሆን ያረጋግጡ።

የድሕረ እንክብካቤ እገዛ መስመር	
ስልክ: 0333 016 0400	
ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)	

ስልክ: 0333 004 6666 ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)

ተደጋጋሚ ጥያቄዎች እና መልሶች

ሃሳቤን ብቀድርስ?

ውሳኔ ላይ ለመድረስ እርግጠኛ ካልሆኑ እባክዎ አይጨነቁ። ህክምና እስከ ሚጅምርበት ሰዓት ድረስ ውሳኔዎን ሊቀይሩ ይችላሉ። እባክዎ ውሳኔዎን ለማረጋገጥ፣ ተጨማሪ ግዜ ያስፈልገኛል ብለው ካሰቡም ያሳውቁን። በሙያው ከሰለጠነ ባለሙያ ጋር መነጋገር ይጠቅመኛል ብለው ካሰቡ ያንን እንዲያደርጉ ልናመቻችልዎ እንችላለን።

ፅንሰ ማስወረድ ለወደፊቱ ልጅ ከማርገዝ ሊከለክለኝ ይችላል ወይ?

ፅንሰ ማስወረድ ልጅ የማርገዝ ችሎታዎት ላይ ተፅእኖ አይፈጥርም። በርግጥ፣ ወዲያውኑ ነው ወደ መደበኛው የወሊድ ብቃት የሚመለሱት፣ ስለዚህ ደግመው እርግዝናን ለመከላከል የወሊድ መከላከያ መጠቀም በጣም ያስፈልጋል።

ፅንሰ ማስወረድ ምን ያህል ገንዘብ ይፈጃል?

ኢንግላንድ፣ ዌልስ እና ኖርዝርን አየርላንድ የሚኖሩ ከሆነ አብዛኛው ፅንሰ ማስወረድ ወጪ በኤን ኤች ኤስ ይሸፈናል። እባክዎ የገንዘብ እገዛው የሚመለከትዎ መሆኑን ለማረጋገጥ፣ አድራሻዎትን እና የጂ.ፒ.ዎን ዝርዝር መረጃ ለመስጠት ይደውሉልን። ከኢንግላንድ እና ዌልስ ውጪ የሚኖሩ ከሆነ ለህክምናው መክፈል ይጠበቅብዎታል።

ለወቅታዊ ዋጋዎች እባክዎ ድረ ገጻችንን ይመልከቱ።

www.nupas.co.uk

በዚያን ቀን ከእኔ ጋር አንድ ሰው መምጣት እችላለሁ?

በሚገባ: ከወዳጅዎ ወይም ጓደኛዎ ድጋፍ ማግኘት ቀኑን [በርትተው] እንዲያልፋት፣ ምን ያህል አጋዥ እንደሆነ ሊረዱ ይችላሉ። በአንዳንዶች የምርመራን ምክክር ክፍለጊዜ ላይ አጅበው ሊገኙ ይችላሉ። ይሁን እንጂ ከዚህ ውጪ ባለው ግዜ ላይ ብቻዎትን እንዲሆኑ ይፈለጋል። እርስዎ ህክምናው/ ስራው በሚሰራልዎ ሰዓት፣ ጓደኛዎ ቴሌቭዥን ወደ ሚያዩበት መጠባበቂያ ክፍል እንዲሄዱ ይነገራቸዋል። እባክዎ ከ16 ዓመት በታች ከሆናቸው እና በሁሉም የህክምና ሂደት ላይ እንዲያጅብዎ ከፈለጉ የቡድናችንን አባል ያሳውቁ።

የእርግዝና ቀሪ አካሎች

ፅንሰ ማስወረድ ከተካሄደ በኋላ የፅንሱ አካል ክፍሎች ምን ይሆናሉ?

የፅንሱን አካል ክፍሎች ማስወገድን በተመለከተ፣ ልዩ ምኞት/ፍላጎት ላይኖርዎ ይችላል። ይህ ሲሆን እኛ እጅግ ጥንቃቄ በተከተለ መንገድ እናስወግደዋለን። አብዛኛው ግዜ የፅንሱን ክፍሎች ከህክምናዊ ቆሻሻዎች ለይተን በማቆየት፣ ወደ ሬሳ ማቃጠያ ስፍራ እንልከዋለን። የሰው ሕዋስ (ቲሹ) ባለስልጣን መመሪያዎች በ http://www.hta.gov.uk/sites/default/files/Guidance_on_the_disposal_of_pregnancy_remains.pdf ላይ ሊገኝ ይችላል።

በተደረገልዎ ህክምና፣ እርስዎ ባደረጉት ቅድመ ዝግጅት ላይ በመመርኮስ፣ የፅንሱን አካላት እራስዎ ሊወስዱት ይችላሉ። ቅድመ ዝግጅቱ፣ የግል የቀብር ስነስርዓት፣ አፈር ማልበስ ወይ ማቃጠልን ያጠቃለለ ሊሆን ይችላል። ከመቃጠል በኋላ ቅሪቱን (አመዳን) መውሰድ ከፈለጉ፣ ውስጡን በማያሳይ እና፣ ውሃ በማያስገባ መያዣ ውስጥ ሊያስቀምጡት ይችላሉ። ከዚያ በኋላ፡

ስልክ: 0333 004 6666 ስልክ: (01) 874 0097 (አይሪሽ)

የግል ምኞቶችን በተመለከተ ለመወያየት ከሚችል የቀብር ዳይሬክተር ጋር ልናገናኝዎ እንችላለን።

ትንንሽ ልጆች አሉኝ : ይዣቸው መምጣት እችላለሁ

ከይቅርታ ጋር ልጆች ክሊኒክ እንዲመጡ አንፈቅድም። ስለዚህ በቀጠሮው ቀን፣ የሚቆዩበት የልጆች ማቆያ ሊያመቻቹ ይገባል። ይህን ማድረግ የማይችሉ ከሆነ፣ ሌላ ቀጠሮ ወይ ህክምና ሊመቻችልዎ ይገባል ማለት ነው።

ህክምናዬ በሚስጥር ይያዛል?

የእርስዎን ፈቃድ ካላገኘን በስተቀር፣ የግል መረጃዎትን ለማንም አሳልፈን አንሰጥም። በማንኛውም ግዜ የግል መብትዎን እና ክብርዎን እንጠብቃለን። ሁሉም የምክክር/ምርመራ እና ህክምና መረጃዎች በሚስጥር ይያዛሉ። ይሁን እንጂ እኛ ጉዳት ወይም ብዝበዛ ሊደርስብዎ ይችላል የሚል ስጋት ከጀመረብን፡ በአካባቢው ለሚገኘው ደህንነት አስጠባቂ ቡድን ልናሳውቅ ህጉ ያስገድድናል። ይህ እርስዎን ለመከላከል ተብሎ የሚደረግ ነው።

የግል መረጃዬ እንዴት ነው ጥቅም ላይ የሚውለው?

እድሜ፡ ክልል፡ የእርግዝናዎች ቁጥር እና የእርግዝናው እድሜ የመሳሰሉ አንዳንድ መረጃዎችን ወደ ጤና ክፍል (ዋና የህክምና መኮንን) እንድንልክ ህጉ ያስገድድናል። የተባለው ፅንሰ ማስወረድ መከናወኑን ማሳወቂያ ቅፅ፣ ወደ ጤና ክፍል ይላካል። በሕግ የተዘጋጀው የHSA4 ቅፅ ይዘት ዋና የህክምና መሆንነት፣ ስለ ፅንሰ ማስወረድ ለማሳወቅ በጥቅም ላይ ይውላል። እንዲሁም የጤና ክፍል ለስታትስቲክስ ይጠቀምበታል።

ከግል መረጃዎ አንዱም እንኳ ለውጪ ሰው ታትሞ አይሰራጭም። ወደ ጤና ክፍል ከሚላከው መረጃ መሃልም፣ የእርስዎን ማንነት ለይቶ መጠቆም ወይም ማወቅ የሆነ ሰው አይቻልም።

አስተያየቶች እና ቅሬታዎች

ይእናንተ እንክብካቤዎ እና ምቹት ለእኛ አስፈላጊዎች ናቸው። እንዲሁም በእያንዳንዱ የእንክብካቤዎ ደረጃ ላይ፣ ከፊተኛ ደረጃውን የጠበቀ እንክብካቤ እናደርግልዎታለን። የሚሰጡንን አስተያየቶች በደስታ እንቀበላለን። ስለዚህ ህክምናዎ ማብቂያ ላይ፣ ስለ አገልግሎታችን የሚሰማዎትን ስሜት እንዲገልጹልን፣ የአስተያየት መስጫ ቅፅ እንሰጥዎታለን። በዚህም አማካኝነት በቀጣይነት እያሻሻልን እንድንሄድ ያግዙናል።

በመደበኛው መንገድ አስተያየት ሊሰጡን፣ ወይ ቅሬታ ሊያቀርቡ የሚፈልጉበት ግዜ ሊኖር እንደሚችል እንረዳለን። አገልግሎታችንን በተመለከተ፣ በማንኛውም ጉዳይ እርካታ ካልተሰማዎት እና ቅሬታ ማቅረብ ከፈለጉ፣ እባክዎ፡-

- የህክምና አባል ወይም የክሊኒኩን ስራ አስኪያጅ ያነጋግሩ ወይም

ኢሜይል ወደ: enquiries@nupas.co.uk ይላኩ።

በቀረበው ቅሬታ ላይ ምርመራ ለማካሄድ፣ እና መልስ ለመስጠት የሚያስፈልገው የግዜ ገደብ፣ በቅሬታው ባህሪ እና ውስብስብነት ላይ ይመረኮሳል። ቅሬታ እንደደረሰን የምርመራ ስራ አስኪያጁ እርሱን ያነጋግሩዎታል። እና ምርመራውና መልሱ የሚጠናቀቅበትን፣ የግዜ ገደብ ከእርስዎ በጋራ ያወጣሉ። ይህ የሚደረገው፣ የሚሰጡት ምላሾች በሚገባቸው ግዜ እና ከተነሳው ጉዳይ ጋር ተመጣጣኝ መሆናቸውን፣ እንዲሁም የቅሬታ አቅራቢውን ፍላጎቶች የተከተለ መሆኑን ለማረጋገጥ ተብሎ ነው።

ጠቃሚ ኦዲራሽኖች/ቁጥሮች

የብሄራዊ ያልተፈለገ እርግዝና ምክር አገልግሎት
(NUPAS) ክሊኒክ

በእርግዝና ዙርያ የምርጫዎች እገዛ፡ የወሊድ መከላከያ እና የጾታዊ ጤንነት ድጋፍ፡ የእገዛ መስመር፡ 0333 004 6666
ድረ ገጽ፡ www.nupas.co.uk

ኤን ኤች ኤስ ቾይስስ (NHS CHOICES)

የወሲባዊ ጤና እና የአካባቢ የወሲብ ጤና አገልግሎቶች መረጃ
ድረ-ገፅ፡ www.nhs.uk

ወሲብ፡ ሊነጋገሩበት የሚገባ

ጾታዊ ጤንነትን የተመለከተ መረጃ ለወጣቶች።

የእገዛ መስመር፡ 0300 123 2930

ድረ-ገጽ፡ www.nhs.uk/worhtalkingabout

ብሩክ (BROOK)

የነጻ እና ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ፣ የጾታዊ ጤንነት ምክር፣

እንዲሁም የወሊድ መከላከያ ከ25 ዓመት በታች ለሆኑ ወጣቶች።

ድረ-ገፅ፡ www.brook.org.uk

የቤተሰብ ምጣኔ ማህበር

የጾታዊ ጤንነትን የተመለከተ መረጃ እና የወሊድ መከላከያ

ምክር፡ የአባላዘር በሽታዎች፡ የእርግዝና አማራጮች፡ ፅንሰ

ማስወረድ እና እርግዝናን አቅድ ማውጣት።

ድረ-ገፅ፡ www.brook.org.uk

የቤት ውስጥ ጥቃት

ለሁሉም ዓይነት የቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባዎች እርዳታ እና

ድጋፍ። የእገዛ መስመር፡ 0808 168 9111

ድረ-ገጽ፡ www.victimsupport.org.uk/domestic/abuse

ማስታወሻዎች

ስልክ: 0333 004 6666 ስልክ: (01) 874 0097 (አዲስአበባ)

ማስታወሻዎች

ስልክ: 0333 004 6666 ስልክ: (01) 874 0097 (አዲስአበባ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

የቀጠሮ ዝርዝር

1ኛ ቀጠሮ

ቀን:

ዕለት:

ጊዜ:

2ኛ ቀጠሮ

ቀን:

ዕለት:

ጊዜ:

የክምና አጠቃላይ መረጃ

ህክምና	ዕለት:	ጊዜ:	አስተያየት
1ኛ ደረጃ መድሃኒት ተወስዷል (ሚፌፕሪስቶን)			
2ኛ ደረጃ መድሃኒት ተወስዷል (4 ሚሶፕሮስቶል ኪኒኖች)			
ከ 4 ሰዓታት በኋላ ቀሪዎቹን 2 ተጨማሪ የሚሶፕሮስቶል ኪኒኖች ውሰድ			
ህመም ለማስታገሻ ኪኒን ተወስዷል		የኪኒኖች ስም:	

የደም ፍሰት ሁኔታ			
ከህክምና 3 ሳምንት በኋላ፣ የተደረገ የእርግዝና ምርመራ ውጤት			ውጤት፡
ማንኛውም ችግር			
ብሄራዊ ያልተፈለገ እርግዝና ምክር አገልግሎት (NUPAS) ክሊኒክ ጋር የተገናኙበት መዝገብ			

